

Raskaudenaikainen mini-ASA

Sinulla on riskitekijöitä, joiden tiedetään altistavan pre-eklampsialle eli raskausmyrkytykselle. Pre-eklampsian ehkäisyssä käytetään pieniannoksista asetyylisalisyylihappoa (mini-ASA).

Käyttö suositellaan aloitettavaksi raskausviikolla 12 ja sitä jatketaan raskausviikolle 36 asti. Myöhemmin lääkitystä ei ole enää tarvetta aloittaa. Annostus on 100mg kerran päivässä.

Mini-ASA –valmisteita saa apteekista ilman reseptiä, markkinoilla seuraavat vaihtoehdot:

- Aspirin® cardio 100mg
- Primaspan® 100mg
- Disperin® 100mg
- ASA-ratiopharm 100mg

Vasta-aiheet mini-ASA hoidolle

- asetyylisalisyylihappoallergia
- sairastettu mahahaava
- verenvuodolle altistava sairaus
- vaikea maksan tai munuaisten vajaatoiminta

Mini-ASA on turvallinen raskausaikana eikä sen ole todettu aiheuttavan sikiöhaittoja. Mini-ASA –hoito saattaa lisätä synnytyksenaikaista verenvuodon riskiä ja siksi sen käyttö lopetetaan loppuraskaudessa.

Lisätietoa: [Raskaudenaikainen kohonnut verenpaine ja pre-eklampsia \(kaypahoito.fi\)](https://www.kaypahoito.fi)