

## Resistenttien bakteerien ja *Candida auriksen* seulonta ja potilassi joittelu vuodeosastolla

Tilanne	Potilaan sijoittaminen sairaalassa	Seulontanäytteet sairaalaan tullessa
<b>Suora sairaalasiirto ulkomailta</b> Koskee myös potilasta, joka tulee sairaalahoitoon alle viikon sisällä ulkomaisesta sairaalahoitoksesta.	<b>Kosketusvarotoimet</b> , 1 h huone, jossa oma WC ja suihku, kunnes moniresistenttien mikrobien kantajuus on poissuljettu, sen jälkeen tavanomainen sijoittelu.	<b>MRSA, VRE, ResGNS ja CaauVi</b>
<b>Ulkomailla dialyysihoidossa oleva potilas</b>	<b>Kosketusvarotoimet</b> , 1 h huone, jossa oma WC ja suihku, kunnes moniresistenttien mikrobien kantajuus on poissuljettu, sen jälkeen tavanomainen sijoittelu.	<b>MRSA, VRE, ResGNS ja CaauVi</b>
Potilaat, jotka ovat <b>edeltäneen vuoden aikana olleet ulkomailla sairaalassa/laitoksessa/pakolaisleirillä tai lastenkodissa, mutta eivät tule suorana sairaalasiirtona</b>	<b>Tavanomaiset varotoimet</b> , 1-2 h potilashuone, kunnes moniresistenttien mikrobien kantajuus on poissuljettu, sen jälkeen tavanomainen sijoittelu	<b>MRSA, VRE, ResGNS ja CaauVi</b> , jos näytteitä ei ole otettu ko. hoitajakson jälkeen.
Potilaat, jotka ovat <b>turvapaikanhakijoita tai ovat edeltäneen vuoden aikana asuneet vastaanottokeskuksissa</b>	<b>Kosketusvarotoimet</b> , 1 h huone, jossa oma WC ja suihku, kunnes moniresistenttien mikrobien kantajuus on poissuljettu, sen jälkeen tavanomainen sijoittelu.	<b>MRSA, VRE ja ResGNS</b>
Potilaat, jotka ovat <b>edeltäneen vuoden aikana asuneet tai työskennelleet sikatilalla</b>	<b>Tavanomaiset varotoimet</b> , 1-2 h potilashuone, kunnes moniresistenttien mikrobien kantajuus on poissuljettu, sen jälkeen tavanomainen sijoittelu	<b>MRSA</b>
Henkilön tiedetään tai epäillään olleen edeltäneen vuoden aikana huumeiden käyttäjä	<b>Tavanomaiset varotoimet</b> , 1-2 h potilashuone, kunnes moniresistenttien mikrobien kantajuus on poissuljettu, sen jälkeen tavanomainen sijoittelu	<b>MRSA</b> Jos huumeiden käyttäjällä on toistuvia hoitokäyntejä, näytteet otetaan 3 kuukauden välein
Riskitiedoissa merkintä: <b>Eristystä vaativa kantajuus: CPE, MRSA, VRE, ESBL-Klebsiella kannat, MDR-Pseu tai MDR-Acin</b>	<b>Kosketusvarotoimet</b> 1 h huone, jossa oma WC ja suihku. Liikkuminen osastolla huoneen ulkopuolella on mahdollista infektioyksikön ohjeistamana	Vain infektioyksikön ohjeistamana
Riskitiedoissa merkintä: <b>Hoidossa huomioitava kantajuus: ESBL- E-coli</b>	<b>Tavanomaiset varotoimet</b> Normaali huonesijoittelu tai yhden hengen huone, jos potilaan ympäristö kontaminoituu eritteillä (esim. ulosteella, virtsalla, haavaeritteellä tai ihoiliseellä)	
Riskitiedoissa merkintä: <b>Hoidossa huomioitava altistus (CPE)</b>	<b>Tavanomaiset varotoimet</b> 1-2 h potilashuone, jossa on WC ja pesutila, kunnes CPE:n kantajuus poissuljettu, sen jälkeen tavanomainen sijoittelu.	<b>ResGNS</b>

<b>Tilanne</b>	<b>Potilaan sijoittaminen sairaalassa</b>	<b>Seulontanäytteet sairaalaan tullessa</b>
Riskitiedoissa merkintä: <b>Hoidossa huomioitava altistus (MRSA)</b>	<b>Tavanomaiset varotoimet</b> 1-2 h potilashuone, jossa on WC ja pesutila, kunnes MRSA:n kantajuus poissuljettu, sen jälkeen tavanomainen sijoittelu.	<b>MRSA</b>
Riskitiedoissa merkintä: <b>Hoidossa huomioitava altistus (VRE)</b>	<b>Tavanomaiset varotoimet</b> 1-2 h potilashuone, jossa on WC ja pesutila, kunnes VRE:n kantajuus poissuljettu, sen jälkeen tavanomainen sijoittelu.	<b>VRE</b>
Riskitiedoissa merkintä: <b>Eristystä vaativa kantajuus: Candida auris</b>	<b>Kosketusvarotoimet:</b> 1 hengen huone, jossa on omaWC ja suihku. Käsihygienian toteuttamisessa huomioidaan myös käsien vesi-saippuapesu. Konsultoi aina infektio lääkäriä	<b>vain infektioyksikön ohjeistamana</b>
Riskitiedoissa merkintä: <b>Eristystä vaativa altistus (Candida auris)</b>	<b>Kosketusvarotoimet,</b> 1 h huone, jossa oma WC ja suihku, kunnes Candida auris -kantajuus on poissuljettu, sen jälkeen tavanomainen sijoittelu. <b>Konsultoi aina infektio lääkäriä</b>	<b>CaauVi</b>

Näytteenotto-ohjeeseen pääset [tästä](#)