

Ulkomailta tullut potilas: resistenttien bakteerien ja *Candida auriksen* seulontaohje

Karbakeneemeille resistentit enterobakteerit (CPE) ja muut vastustuskykyiset mikrobit ovat lisääntyneet maailman laajuisesti. **Ulkomainen sairaalahoido** on erityinen riskitekijä resistentin bakteerin löytymiselle, mutta löydöksiä voi olla muillakin matkailijoilla (erityisesti Intia, Pakistan, Bangladesh, mutta myös Kreikka, Turkki, Kroatia). Karbakeneemeille resistenttien suolistobakteerien aiheuttamien infektioiden hoito on vaikeaa ja niiden leviämistä sairaalaympäristössä on pyrittävä estämään.

Uusi merkittävä sairaalahygieeninen uhka on *Candida auris*, joka voi aiheuttaa vakavia ja hankalasti hoidettavia yleisinfektioita sairaala- ja laitospotilaille. Jos *Candida aurista* ei tunnisteta ajoissa, se voi aiheuttaa ikäviä laitosepidemioita, joita on vaikeaa ja kallista hoitaa ja torjua. [Candida auris - THL](#)

Jokaisen sairaalaan jäävän potilaan ulkomaanmatkailu tulee selvittää viimeisen vuoden ajalta heti sairaalaan tullessa ja infektiolääkärin konsultaatiota on syytä harkita herkästi infektiioireisilla potilailla.

Ulkomailla matkailleita hoidetaan tavanomaisin varotoimin, ellei heillä ole sellaista infektiota (erityisesti ripuli), joka edellyttää kosketusvarotoimia. Jos potilaan tilanne edellyttää alla olevan taulukon mukaisesti kosketusvarotoimia, kaikkien näytteiden tulee olla vastattuna ennen kuin käynnistetyt kosketusvarotoimet puretaan. Ensimmäiset näytteet on syytä pyrkiä ottamaan jo päivystyksessä.

| Tilanne | Potilaan sijoittaminen | Seulontanäytteet |
|--|--|---|
| Suora sairaalasiirto ulkomailta Koskee myös potilasta, joka tulee sairaalahoittoon alle viikon sisällä ulkomaisesta sairaalahoitajaksosta. | Kosketusvarotoimet , 1 hengen huone, jossa oma WC ja suihku, kunnes moniresistenttien mikrobien kantajuus on poissuljettu, sen jälkeen tavanomainen sijoittelu. | MRSA, VRE, ResGNS ja CaauVi kahtena eri päivänä |
| Ulkomailla dialyysihoidossa oleva potilas | Kosketusvarotoimet , 1 h huone, jossa oma WC ja suihku, kunnes moniresistenttien mikrobien kantajuus on poissuljettu, sen jälkeen tavanomainen sijoittelu. | MRSA, VRE, ResGNS ja CaauVi kahtena eri päivänä |
| Potilaat, jotka ovat edeltäneen vuoden aikana olleet ulkomailta sairaalassa/laitoksessa/pakolaisleirillä tai lastenkodissa, mutta eivät tule suorana sairaalasiirtona | Tavanomaiset varotoimet 1-2 hengen huone, jossa on oma WC ja pesutila, kunnes moniresistenttien mikrobien kantajuus on poissuljettu, sen jälkeen tavanomainen sijoittelu | MRSA, VRE, ResGNS ja CaauVi kahtena eri päivänä, jos näytteitä ei ole otettu ko. hoitajakson jälkeen. |

| Tilanne | Potilaan sijoittaminen | Seulontanäytteet |
|--|---|---|
| Potilaat, jotka ovat turvapaikanhakijoita tai ovat edeltäneen vuoden aikana asuneet vastaanottokeskuksissa | Kosketusvarotoimet, 1 hengen huone, jossa oma WC ja suihku, kunnes moniresistenttien mikrobien kantajuus on poissuljettu, sen jälkeen tavanomainen sijoittelu | MRSA, VRE ja ResGNS kahtena eri päivänä |

- MRSA-, VRE-, ResGNS- ja CaauVi [näytteiden otto -ohje](#)
- Katso myös ohjeet [Kosketusvarotoimet](#) sekä [Tavanomaiset varotoimet](#)