

Turvakoeseuranta – TYKS ERVA-alueen reumasairauksien yksiköt

Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien alueella julkisella sektorilla toimivien reumatologiien konsensuksen perusteella reumalääkkeiden turvakoeseurantaa kevennetään ja yhtenäistetään alueella 1.1.2016 alkaen.

Reumapotilaiden lääkehoidon seurantakokeet 1.1.2016:

Antireumaattihoidon aloitus:

- PVK+T, Neut, CRP, La, ALAT, Krea (eGFR), U-KemSeul

Sen jälkeen 2-3, 6 ja 12 vkoa, sitten 3-6 kk välein

- Pvk+T, Neut, ALAT
- **Siklosporiini:** Krea (eGFR)
- **Pistoskulta:** U-Prot 1x / 2 vkoa 3 kk, sen jälkeen ennen jokaista pistosta

Joka 6. kk

- Krea (eGFR)

6–12 kk:n välein sairauden hoitoarviossa

- CRP, La, U-KemSeul

Annosnosto: (2-)3 viikon kuluttua ylimääräiset turvakokeet

Turvakokeiden raja-arvot:

- Leuk > 3.0
- Neut > 1.0
- Tromb > 100
- Alat < 2–2,5 x viitearvo, huomioi lähtöarvot!
- U-Prot +, kontrolli 1-2 vkoa, edelleen +, dU-Prot ja lääkärin konsultaatio

Jos arvot poikkeavat lääketauko ja kontrolli 2-3 vkon kuluttua. Jos arvot selvästi poikkeavat konsultoi lääkäriä.