

Ruoansulatuskanavan läpikulun tutkimus

Miksi tutkimus tehdään

Tutkimuksella selvitetään suoliston toimintaa.

Tutkimukseen valmistautuminen

Tutkimuksessa käytetään Transit-Pellets -nimisiä kapseleita. Saat nieltävät kapselit sinua hoitavasta yksiköstä (poliklinikka tai osasto). Saat hoitavasta yksiköstä myös ohjeen, miten kapselit otetaan.

Voit nielaista kapselit kokonaisina veden kanssa. Voit myös avata kapselin ja niellä pelkät rinkulat esimerkiksi jogurtin tai viilin joukkoon sekoitettuna.

Älä käytä tutkimusjakson aikana samanaikaisesti suolen toimintaa vilkastuttavia ja nopeuttavia lääkkeitä, pienois- tai vesiperä-ruiskeita.

Älä myöskään poikkea tavanomaisesta ruokavaliostasi. Saat siis syödä ja juoda normaalisti. Saat ottaa normaalisti muut lääkkeet paitsi ulostuslääkkeitä. Älä muuta elintapoja aikaisemmasta.

Jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana, ota yhteyttä siihen poliklinikkaan tai osastoon, josta sinut lähetettiin tutkimukseen.

Miten tutkimus tehdään

Kapselit kulkeutuvat ruoansulatuskanavaa pitkin ja poistuvat ulosteen mukana.

Vatsastasi otetaan yksi röntgenkuva seitsemän päivän kuluttua ensimmäisen kapselin ottamisen jälkeen.

Kuvaus kestää yleensä noin 5 -15 minuuttia.

Tutkimuksen jälkeen

Saat tutkimuksen vastaukset siltä poliklinikalta tai osastolta, josta sinut lähetettiin tutkimukseen.

Muuta huomioitavaa

Tutkimuksesta ei tule erillistä maksua. Se sisältyy poliklinikkamaksuun.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tutkimukseen liittyvissä asioissa, ota yhteyttä siihen poliklinikkaan tai osastoon, josta sinut lähetettiin tutkimukseen.