

Sappirakon kanavointi radiologisessa ohjauksessa

Tilauuskoodi

JK1AT Sappirakon kanavointi radiologisessa ohjauksessa

Toimenpiteen tarkoitus

Kolekystiitin hoito potilaille, jotka eivät ole leikkauskelpoisia.

Tutkimuspyyntö ja ajanvaraus

Hoitava lääkäri tilaa toimenpiteen suoraan toimenpideradiologilta:

Terhi Lehtola 85-5532

Timo Jalonen 85-9272

Päivystysaikana päivystävältä radiologilta 85-7441

Tutkimuspyyntö Lifecaren Radi-lehdelle.

Veren hyytymisen ja vuotoriskin arviointi sekä antitromboottiset lääkkeet

- Katso erillinen ohje: [Suositus veren hyytymisen ja vuotoriskin arvioinnista ennen radiologisia toimenpiteitä](#)
- Veren hyytymiskokeet otetaan yllä olevan ohjeistuksen mukaan.

Ennen toimenpidettä

- Ravinnotta, aamulääkkeet voi ottaa. (Huomioi antitromboosilääkitys.)
- Esilääkitys:
 - Hoitavan lääkärin ohjeen mukaan aloitetaan antibioottiprofylaksia, ellei potilaalla ole muuta antibioottia menossa esim. Tazocin/Piperacillin tai Tavanic/Levofloxacin (toimenpidettä edeltävänä päivänä ja toimenpidepäivänä).
 - Petidin 50–75 mg i.m.
 - Atropin 0.5 mg i.m. (huomioi potilaan muu kipulääkitys). Kuvantamisesta ilmoitetaan esilääkkeen antoaika.
- i.v. infuusio laitettuna vasempaan käteen.
- Potilasvaatteet, ei avopaitaa.
- Potilaan tiedot laitetaan kuvantamisen kuljetuslistalle.
- Kuvantamisen potilaskuljettaja hakee potilaan sängyllä toimenpiteeseen.

Toimenpiteen jälkeen

- 6 tunnin vuodelepo sisäisen vuotovaaran vuoksi.

Toimenpiteen kirjaus ja lausunto

- Kuvantaminen kirjaa tarpeelliset tiedot toimenpiteestä ja sen kulusta Raduun ja Lifecaren Hoke-lehdelle.
- Radiologin lausunto nähtävissä Lifecaren Radi-lehdellä.

Muuta huomioitavaa

Toimenpiteeseen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä toimenpidehoitajaan p. 85–9313.