

# Sappitiekatetrin vaihto radiologisessa ohjauksessa

---

## Tilauuskoodit

JK3FT Kat.vaihto, sappitie

## Toimenpiteen tarkoitus

Dreenin oikeanmukaisen toiminnan takaamiseksi. Sappineste syövyttää ja sakkauttaa dreeniä ajan kuluessa.

## Tutkimuspyyntö ja ajanvaraus

- Dreeni vaihdetaan 2-3 kk välein. Radiologi päättää vaihto-ajan, joka ilmoitetaan kuvantamisesta laitton tai edellisen vaihdon yhteydessä.
- Hoitava yksikkö huolehtii, että potilaalla on vaihtoon tullessaan tutkimuspyyntö myös seuraavaa vaihtoa varten. Röntgenhoitaja tekee ajanvarauksen.
- Osasto/päiväsairaala kutsuu potilaan.

## Valmistautuminen toimenpiteeseen

- Toimenpide ei vaadi laboratoriotutkimuksia (P-INR), koska uutta punktiota ei tehdä. Dreeni vaihdetaan vanhaa reittiä pitkin.
- Jos dreeni on irronnut katso ohje [Sappiteiden kanavointi läpivalaisuohjauksessa eli PTD](#).

## Ennen toimenpidettä

- Ravinnotta, aamulääkkeet voi ottaa.
- Esilääkitys lähettävän lääkärin määräyksestä:
  - Petidin 50–75 mg i.m. (huomioi potilaan muu kipulääkitys). Kuvantamisesta ilmoitetaan esilääkkeen antoaika.
- i.v. infuusio laitettuna vasempaan käteen.
- Potilasvaatteet, ei avopaitaa.
- Potilaan tiedot laitetaan kuvantamisen kuljetuslistalle.
- Kuvantamisen potilaskuljettaja hakee potilaan sängyllä toimenpiteeseen.

## Toimenpiteen jälkeen

- Toimenpiteen jälkeen ei vuodelepoa jatkohoitona.
- PTD-katetria huuhdellaan entiseen tapaan (20ml keittosuolaa).

## **Toimenpiteen kirjaus ja lausunto**

- Kuvantaminen kirjaa tarpeelliset tiedot toimenpiteestä ja sen kulusta Raduun ja Lifecaren Hoke-lehdelle.
- Radiologin lausunto nähtävissä Lifecaren Radi-lehdellä.