

## Selkäydinnesteenäytteen otto

### Näytteenotto

Sinulle on varattu aika lannepistoa, eli selkäydinnesteenäytteen ottoa varten neurologian poliklinikalle.

Selkäydinnesteenäytteen ottaa lääkäri.

Näytteenoton ajan makaat kyljelläsi tai istut.

Selkäydinnesteenäytteen otto on tavallinen toimenpide.

Se on vaaraton ja yleensä kivuton.

Toimenpide kestää noin 15- 30 minuuttia.

Sinusta otetaan myös verikokeita.

Sairaanhoitaja varaa verikokeet lääkärin määräyksen mukaisesti.

### Selkäydinnesteenäytettä

#### ei aina voi ottaa

Selkäydinnesteenäytettä ei voida ottaa jos sinulla on:

- nuhakuume
- vatsatauti
- alaselässä tulehtunut ihoalue

Jos sinulla on jokin näistä sairauksista ota yhteyttä neurologian poliklinikalle.

### Lääkkeet ja näytteenotto

Osa lääkkeistä vaikuttaa selkäydinnesteenäytteen ottoon.

Siksi annamme joidenkin lääkkeiden käytöstä erilliset ohjeet.

Ota yhteyttä neurologian poliklinikkaan, jos sinulla on käytössä

jokin seuraavista lääkkeistä:

- Marevan®
- Plavix®
- Efient®
- Xarelto®
- Pradaxa®
- Eliquis®
- Clopidogrel®
- Fragmin®
- Klexane®
- Innohep®
- Asasantin retard®
- Orisantin depot®.