

Siklosporiini, SANDIMMUN NEORAL® CIQORIN® – reumasairauksien hoidossa

Vaikutustapa

Siklosporiini rauhoittaa niveltulehdusta ja estää reumasairauden etenemistä. Psoriasisniveltulehduksessa myös iho-oireet lievittyvät. Siklosporiinin vaikutus alkaa 1-3 kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta.

Annostus/antotapa

Lääkettä on saatavana 25, 50 ja 100 mg:n kapseleina. Lääkäri määrää annoksen, joka yleensä on 2-3 mg/painokiloa kohti vuorokaudessa. Omin päin annoksia ei saa muuttaa. Kapselit niellään kokonaisina runsaan nesteen kera. Ne irrotetaan pakkauksesta juuri ennen käyttöä.

Haittavaikutukset

Siklosporiini -hoidon haittavaikutukset ovat useimmiten lieviä eivätkä vaadi hoidon keskeyttämistä. Hoidon aikana esiintyy joskus vähäistä käsien vapinaa, lisääntyntä karvankasvua tai lievää ikenien turvotusta. Pahoinvointia, väsymystä sekä käsien ja jalkojen puutumista tai pistelyä saattaa ilmaantua. Lääke voi vaikuttaa munuaisten toimintaan ja nostaa verenpainetta, joten niitä seurataan hoidon aikana. Joissakin tapauksissa kohonnutta verenpainetta voidaan joutua hoitamaan verenpainelääkkeellä.

Raskaus ja imetys

Raskauden ja imettämisen aikana lääkettä voidaan harkiten käyttää. Neuvottele lääkityksestäsi ennen raskautta lääkärisi kanssa.

Seuranta

Lääkkeen aloituksesta turvakokeet **2-3, 6 ja 12 vko välein, sitten 3-6 kk välein**. Tulokset tarkistetaan terveyskeskuksessa. Turvakokeet ovat seuraavat **PVK, B-NEUT ja ALAT**. Krea tutkitaan 3-6 kk välein. **U-kemseu, CRP** ja **LA** tutkitaan hoidon arvion yhteydessä ennen lääkärikäyntiä 6-12 kk välein.

Verenpaineen mittaus Verenpaineen säännöllinen seuranta aluksi viikon välein, jatkossa 3-6 kk välein. Alaverenpaine ei saisi nousta yli 100 hoidon aikana.

Muuta huomioitavaa

Huolehtimalla suun ja hampaiden erityisestä puhtaudesta voidaan vähentää ikeniin kohdistuvia haittavaikutuksia. **Siklosporiinin käytöstä on muistettava mainita hammaslääkärissä käydessä.**

Eräät lääkkeet saattavat vaikuttaa siklosporiinin tehoon tai haittavaikutuksiin, joten hoitavan lääkärin **on oltava selvillä kaikista samanaikaisista lääkityksistä.**

Linkki [Reumalääkkeiden ohjeet | Reumatalo.fi | Terveyskylä.fi](#)

Yhteystiedot

Reumasairauksien poliklinikka
Soittoaika klo 09-12
p.02 627 8612