

Skleroterapia

Tilauuskoodit

JJ5KT	Maksakystan skleroterapia radiologisessa ohjauksessa
KA6KT	Munuaiskysta, skleroterapia radiologisessa ohjauksessa

Toimenpiteen tarkoitus

Maksa- tai munuaiskystan tyhjennys ja käsittely alkoholilla.

Tutkimuspyyntö ja ajanvaraus

Hoitava lääkäri tekee tutkimuspyynnön Lifecaren Radi-lehdelle ja tutkimuspyyntö lähetetään Kuvantamiseen. Kuvantaminen varaa ajan ja ilmoittaa sen lähettävään yksikköön. Lähettävä yksikkö kutsuu potilaan ja varaa vuodeosastopaikan.

Veren hyytymisen ja vuotoriskin arviointi sekä antitromboottiset lääkkeet:

- Katso erillinen ohje: [Suositus veren hyytymisen ja vuotoriskin arvioinnista ennen radiologisia toimenpiteitä](#).
- Veren hyytymiskokeet otetaan yllä olevan ohjeistuksen mukaan.

Ennen toimenpidettä

- Ravinnotta, aamulääkkeet voi ottaa. (Huomioi antitromboosilääkitys).
- Esilääkitys:
 - Petidin 50–75 mg i.m. (huomioi potilaan muu kipulääkitys). Kuvantamisesta ilmoitetaan esilääkkeen antoaika.
- i.v. infuusio laitettuna
- Potilasvaatteet, ei avopaitaa.
- Potilaan tiedot laitetaan kuvantamisen kuljetuslistalle.
- Kuvantamisen potilaskuljettaja hakee potilaan sängyllä toimenpiteeseen.

Mikäli kysta on kookas, voidaan potilas laittaa osastolle dreenin kanssa odottamaan kystan tyhjenemistä. Potilas tulee muutaman tunnin kuluttua takaisin kuvantamiseen kystan alkoholikäsittelyä varten.

Toimenpiteen jälkeen

- 6 tunnin vuodelepo sisäisen vuotovaaran vuoksi.
- Pistokohtaa ei saa kastella vuorokauteen. Raskaiden taakkojen nostoa ja kovaa liikuntaa on hyvä välttää vuorokauden ajan toimenpiteestä.

Toimenpiteen kirjaus ja lausunto

- Kuvantaminen kirjaa tarpeelliset tiedot toimenpiteestä ja sen kulusta Raduun ja Lifecaren Hoke-lehdelle.
- Radiologin lausunto nähtävissä Lifecaren Radi-lehdellä.

Muuta huomioitavaa

Toimenpiteeseen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä toimenpidehoitajaan p. 85–9313.