

Staph. aureus –kantajuuden kevennyshoito ja traumakirurgia, jossa laitetaan koko- tai puoliproteesi


Kansainvälisten tutkimusten perusteella tiedetään, että Staph. aureus- bakteerin iho- ja nenäkantajuus lisäävät haavatulehduksen ja proteesi-infektion riskiä ja kantajuuden kevennyshoito vähentää tulehdusriskiä. Traumapotilaiden kohdalla kantajuutta ei ole mahdollista etukäteen tutkia.

Infektioyksikön suosituksesta on yhdessä ortopedien kanssa päätetty, että infektioriskin pienentämiseksi traumakirurgiassa, jossa potilaalle laitetaan koko- tai puoliproteesi

- kaikille potilaille tehdään klorheksidiini-pesu ennen operaatiota
 - mieluiten suihkussa [Ericept CHG-vaahtoa](#) käyttäen. Vaahdo hierotaan kostutetulle iholle ja hiuspohjaan, annetaan vaikuttaa 2 minuuttia ja huuhdellaan pois.
 - Jos potilasta ei voida viedä suihkuun, käytetään pesussa Bagbath Chlorhexidine 2% liinoja pakkauksessa olevan ohjeen ja oheisen kuvan mukaan
 - Jos leikkaus siirtyy, pesut uusitaan kerran päivässä.
- Lisäksi aloitetaan mupirosiinihoito (Bactroban Nasal 2 %) nenään molempiin sieraimiin x 2 viiden vrk:n ajan (1 tuubi). Nasal-nenävoidetta sivellään molempiin sieraimiin pumpulipuikolla noin 1 cm:n pituinen annos. Lääkkeen ottamisen jälkeen sieraimet suljetaan painamalla nenää sivuilta useita kertoja. Mupirosiinihoito pyritään aloittamaan mahdollisimman pian leikkauspäätöksen jälkeen, mielellään jo päivystyspoliklinikalla. Päivystyspoliklinikalla aloitettu hoito kirjataan päivystyksen seurantakaavakkeelle. Mupirosiini-voide kulkee potilaan mukana. Osastolla aloitettu hoito kirjataan HOKE:en ja osaston lääkelistalle. Leikkausosastoa varten tiedot kirjataan preoperatiiviseen vaiheeseen tulotilanne – välilehdelle muut huomiot kohtaan.
- Leikkaussalissa tarkastetaan, ovatko nämä toimet tapahtuneet. Jos hoitoa ei ole aiemmin aloitettu, mupirosiinihoito käynnistetään viimeistään leikkaussalissa.

BagBath Chlorhexidine 2%

Käyttöohje



Pakkaus voidaan lämmittää mikroaaltouunissa (15 - 30 sekuntia riippuen mikroaaltouunin tehosta). Vältä pakkauksen ylikuumentamista.

1. Avaa paketti. Käsittele lämmitettyä pakkausta varoen, sillä se voi olla kuuma.
2. Pese potilas käyttäen yhden liinan kuhunkin kehonosaan, jotka on listattu yllä olevassa kuvassa. Pese potilaan kehonosat siinä järjestyksessä, joka vastaa käytössänne olevaa pesuohjeistusta.
3. Anna ihon kuivua.
4. Hävitä kaikki käy käytetyt ja pakkauksesta ylijääneet pesuliinat.

Kuva: [BagBath Chlorhexidine 2% pesuliinan käyttöohje](#)