

Sulfasalatsiini, SALAZOPYRIN EN® – reumasairauksien hoidossa

Käyttöaiheet

Sulfasalatsiinia käytetään mm. nivelreuman, selkärankareuman, suolistosairauksiin liittyvien niveltulehduksien ja muiden pitkäaikaisten niveltulehdusten hoitoon.

Lääkevalmiste ja vaikutustapa

Sulfasalatsiini on sulfan ja salisyylihapon yhdistelmä. Lääke rauhoittaa niveltulehdusta ja estää sen etenemistä.

Annostus ja antotapa

Reumasairauksien hoidossa sulfasalatsiinia käytetään suolistoliukoisina 500 mg tabletteina. Jotta sen rakenne ei vaurioituisi, on se nieltävä kokonaisena. Haittavaikutusten vähentämiseksi lääkitys aloitetaan pienellä annoksella 1 tabletti 2 kertaa vuorokaudessa ja nostetaan asteittain 2-3 tablettiin 2 kertaa vuorokaudessa. Lääke kannattaa ottaa aterian yhteydessä runsaan nesteen kera. Lääkettä ei oteta metotreksaatin kanssa samaan aikaan.

Haittavaikutukset

Tavallisimpia haittavaikutuksia ovat vatsavaivat, pahoinvointi ja täyttävä tunne ylävatsalla sekä päänsärky. Hyvin harvoin haittavaikutus ilmaantuu kuumeisena ihottumana, tuolloin lääkitys täytyy lopettaa heti ja ottaa yhteyttä hoitavaan lääkäriin. Haittavaikutuksina voi olla muutoksia verenkuvassa kuten valkosolujen laskua tai maksa-arvojen nousua. Virtsa saattaa muuttaa väriään lääkityksen aikana. Mahdolliset haittavaikutukset tulevat yleensä 3 ensimmäisen hoitokuukauden aikana.

Raskaus ja imetys

Lääkettä voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Raskauden aikana suositellaan lisälääkityksenä foolihappoa 1 mgx1. Sulfasalatsiini voi vähentää tilapäisesti siittiöiden muodostumista, mistä syystä lääkettä ei suositella annettavaksi sellaisille miehille, joilla on perheessä lapsettomuusongelmia. Lääkityksen lopettamisen jälkeen siittiömuodostus normalisoituu.

Seuranta

Turvakokeet tutkitaan **2-3, 6 ja 12 viikon kuluttua aloituksesta ja jatkossa 3-6 kuukauden välein**. Tulokset tarkistetaan terveyskeskuksessa. Turvakokeet ovat seuraavat: **PVK, B-NEUT ja ALAT. KREA, U-Kemseu, CRP ja La** tutkitaan sairauden hoitoarvion yhteydessä ennen lääkärikäyntiä 6-12 kk välein. Annosnoston yhteydessä ylimääräiset turvakokeet 2-3 vko:n kuluttua.

Muuta huomioitavaa

Sulfasalatsiinia ei tarvitse tauottaa leikkauksen yhteydessä. Rokottaa voi normaaliin tapaan.

Linkki [Reumalääkkeiden ohjeet](#) | [Reumatalo.fi](#) | [Terveyskylä.fi](#)

Yhteystiedot

Reumasairauksien poliklinikka

Soittoaika klo 09-12

p.02 627 8612