

Sydämen oikean puolen tutkimus

Tutkimuksen avulla selvitetään sydämen oikean kammion ja eteisen sekä niihin yhteydessä olevien verisuonten paine- ja virtausolosuhteita. Tutkimus ei ole täysin vaaraton, mutta vakavat komplikaatiot (paikallinen ihonalainen verenvuoto, keuhkon kasaanpainuminen, sydänpussin täyttyminen) ovat harvinaisia.

Ennen sairaalaan tuloa

Ole syömättä **vähintään neljä tuntia** ennen sairaalaan tuloa, vettä voit juoda vähän.

Ota lääkkeesi normaalista pienen vesimäärän kanssa.

Ota mukaan käyttössäsi olevat lääkkeet (esim. lääkedosetti) ja lista käyttämistäsi lääkkeitä sekä insuliinit ja astmalääkkeet.

Huomioi jo sairaalaan saapuessasi, että autolla ajaminen on kielletty toimenpidepäivänä.

Jos sinulla on insuliinihoitoinen diabetes:

Pistä pitkävaikutteinen insuliini normaalisti. Mikäli käytät ateriainsuliinia, se pistetään toimenpiteen jälkeen ruokailun yhteydessä.

Ennen toimenpidettä

Hoitaja asentaa sinulle suonikanyylin lääkkeiden antoa varten.

Tutkimuksen aikana

Tutkimus tehdään paikallispuudutuksessa yleensä kaulalaskimon kautta röntgenlöpivalaisussa. Tutkimus on puudutus pistosta lukuun ottamatta kivuton ja kestää noin tunnin.

Tutkimuksen jälkeen

Ei yleensä ole tarvetta vuodelepoon, mutta sinua seurataan sairaalassa muutama tunti ennen kotiin pääsyä.

Ota yhteyttä

- Jos sairastut kuumeiseen tartuntatautiin, sinulle tulee muu este tai sinulla on toimenpiteeseen liittyviä kysymyksiä.
- Jos tiedät tai epäilet olevasi raskaana

Yhteystiedot

Sydänyksikkö

Hoidonvaraaja puhelin 044-707 9381, maanantaista perjantaihin kello 09.00-12.00