



## Sydänlihaskoepalan otto

---

Sydänlihaksen koepalan avulla tutkitaan sydänlihaskudoksen tilaa. Koepala otetaan sydänlihaskudoksen ja sydänlihastulehduksen syyn selvittämiseksi, solusalpaajahoidon sydänvaikutusten seuraamiseksi sekä sydänsiirtopotilaan seurannassa hylkimisreaktion toteamiseksi.

Koepalan otto tehdään paikallispuudutuksessa. Toimenpide ei ole täysin vaaraton, mutta vakavat komplikaatiot, kuten veren vuotaminen sydänpussiin, ovat harvinaisia.

### Ennen toimenpidettä

Ota lääkkeesi normaalisti. Huomioi muut saamasi ohjeet.

Ole syömättä **vähintään neljä tuntia** ennen toimenpidettä, vettä voit juoda vähän.

Sinusta otetaan tarvittaessa laboratoriotutkimuksia ja sydänfilmi (EKG).

Hoitaja asentaa sinulle suonikanyylin lääkkeiden antoa varten.

### Toimenpiteen aikana

Koepalapihti viedään röntgenlöpivalaisussa joko kaulalta tai nivustaipeesta laskimoa pitkin sydämen oikeaan kammioon, josta otetaan muutama koepala.

Toimenpide kestää noin puoli tuntia ja on puudutuspaikasta lukuun ottamatta kivuton.

### Toimenpiteen jälkeen

Sinusta otetaan tarvittaessa keuhkokuva. Vointiasi seurataan muutama tunti sairaalassa toimenpiteen jälkeen.

Jos seurantakäynnillä tehdään lisätutkimuksia, kuten sepelvaltimoiden varjoainekuvaus, sinulle varataan jatkohoitoa sydänyksikköön.

### Ota yhteyttä

- Jos sairastut kuumeiseen tartuntatautiin, sinulle tulee muu este tai sinulla on toimenpiteeseen liittyviä kysymyksiä.
- Jos tiedät tai epäilet olevasi raskaana

### Yhteystiedot

Sydänyksikkö, Hoidonvaraaja, puhelin 044 707 9381,  
maanantaista perjantaihin kello 09.00-12.00