

Syklofosfamidi, SENDOXAN®, SYKLOFOSFAMID® – reumasairauksien hoidossa

Vaikutustapa/käyttöaiheet

Eräissä reumasairauksissa imusolujen toiminta on häiriintynyt. Tähän pyritään vaikuttamaan ns. immunosuppressiivisilla lääkkeillä eli solunsalpaajilla, kuten syklofosfamidilla. Sitä käytetään vaikeiden systeemisten verisuonitulehdusten ja sidekudosreumasairauksien lääkityksenä. Vaikutus ilmaantuu 1-3 kuukauden kuluessa.

Annostus/antotapa

Lääkettä on saatavana 50 mg:n tabletteina. Keskimääräinen hoitoannos vaihtelee 1.5-2.5 mg painokiloa kohden vuorokaudessa (1-4 tablettia/päivä). Tabletit niellään kokonaisina mieluiten tuntia ennen ateriaa runsaan nesteen kera. Mikäli vatsaärstyys on voimakasta, tabletit voidaan ottaa myös aterian yhteydessä.

Lisäksi lääkettä voidaan antaa sairaalassa laskimonsisäisenä tiputuksena.

Haittavaikutukset

Tavallisimpia haittavaikutuksia ovat pahoinvointi tai hiusten harveneminen.

Luuydinhaittavaikutus voi olla vakava ja siitä syystä verisolujen lukumäärää on seurattava.

Alttius tulehdukseen voi lisääntyä. Kuumeisten tulehdussairauksien aikana lääkitys pitää tauottaa.

Muita mahdollisia haittavaikutuksia ovat kuukautisten poisjäänti, siittiöiden muodostushäiriöt ja virtsarakkoärstyys. Hoitoa jatketaan vain poikkeustapauksissa yli kahden vuoden ajan.

Rakkoärstyksen minimoimiseksi tulee juoda runsaasti vettä ja huolehtia rakon tyhjentämisestä usein.

Raskaus ja imetys

Raskauden ja imetyksen aikana lääkettä ei saa käyttää. Huolehdi lääkityksen aikana luotettavasta ehkäisystä!

Mikäli raskautta suunnitellaan, lääkitys on lopetettava viimeistään 3 kuukautta ennen suunniteltua raskautta. Suositus koskee myös miehiä.

Seuranta

Lääkkeen aloituksesta turvakokeet **2-3, 6 ja 12 viikon välein, sitten 3-6 kk välein**. Tulokset tarkistetaan terveystarkastuksessa. Turvakokeet ovat seuraavat **PVK, B-NEUT ja ALAT**.

KREA, U-Kemseu, CRP ja LA tutkitaan hoitoarvion yhteydessä ennen lääkärin käyntiä 6-12 kk välein

Muuta huomioitavaa

Lääke kannattaa tauottaa viikko ennen leikkausta ja lääkitystä voidaan jatkaa 1-2 viikon kuluttua, kun haava parantunut. Eläviä heikennettyjä rokotuksia ei suositella.

Linkki [Reumalääkkeiden ohjeet | Reumatalo.fi | Terveyskylä.fi](#)

Yhteystiedot

Reumasairauksien poliklinikka
Soittoaika klo 09-12
p.02 627 8612