

Venesektio

Venesektio on toimenpide, jossa veren punasolujen määrää vähennetään sopivaksi ottamalla verta laskimosta samaan tapaan kuin verenluovutuksessa. Venesektiota käytetään hoitona esimerkiksi polysytemia verassa, jossa luuydin tuottaa liikaa verisoluja ja hemokromatoosissa, jossa rautaa kertyy liikaa elimistöön.

Venesektion jälkeen voi olla huimaava olo. Tämän ehkäisemiseksi juo pari lasillista vettä tai mehua välittömästi ennen toimenpidettä ja heti toimenpiteen jälkeen korvaamaan menetettyä verimäärää.

Venesektio tehdään vuoteessa makuuasennossa. Käsivarren laskimoon asennetaan neula, jonka kautta lasketaan veripussiin 300-500 ml verta lääkärin ohjeen mukaisesti. Toimenpiteen onnistumiseksi potilas voi puristella palloa tai kättä nyrkkiin.

Neulan poiston jälkeen pistoskohta peitetään sidetaitoksella, jota on kannattaa painaa napakasti hetken aikaa verenvuodon ja mustelman ehkäisemiseksi. Sidosta on hyvä pitää pari tuntia, koska verenvuototaipumus voi olla lisääntynyt, vaikka verihiutaleiden määrä olisikin korkea.

Lepää toimenpiteen jälkeen hetki vuoteessa, jotta verenkierto ehtii tasaantua. Toimenpidepäivänä tulee välttää kovaa fyysistä räsitusta, urheilusuorituksia sekä saunomista.

Yhteystiedot

Hematologian poliklinikka
Maanantaista perjantaihin kello 9.00-14.00
Hoitajan puhelin 044 707 7981