

Virtsarakon tähystys anestesiassa

Yleistä

Virtsarakon tähystyksessä voidaan selvittää virtsaamiseen liittyvien oireiden syitä ja suorittaa toimenpiteitä. Tähystys tehdään puudutuksessa tai nukutuksessa.

Kivunhoito

Tähystyksen jälkeen saattaa ilmetä kirvelyä virtsaputkessa virtsaamisen yhteydessä. Toimenpiteestä johtuvia ärsytysoireita voit lievittää riittävällä nesteen nauttimisella (2 litraa vuorokauden aikana) muutamana toimenpidettä seuraavana päivänä. Yleensä kipulääkkeen tarvetta ei ole. Tarvittaessa voit käyttää ilman reseptiä saatavia kipulääkkeitä muutaman päivän ajan.

Huomioitavaa

Jos sinulla ilmenee virtsatieinfektion oireita (kirvely, alavatsakipu, virtsa sameaa tai haisee pahalle), käy virtsanäytekontrollissa omassa terveystieteessä. Tähystyksen jälkeen ensimmäisillä virtsaamiskerroilla voi virtsassa olla hieman verta.

Jälkitarkastus

Jälkitarkastus sovitaan tarvittaessa.

Ota yhteyttä, jos

- verisyys virtsassa lisääntyy tai jatkuu yli kolme vuorokautta
- virtsaaminen vaikeutuu

Yhteystiedot

Päiväkirurgian yksikkö
Maanantaista perjantaihin kello 8.00-15.00
Puhelin 02 627 3840

Leikkausosaston kotiutushoitaja
Maanantaista perjantaihin kello 8.00-15.00
Puhelin 044 707 7488

Kirurgian osasto 2
Puhelin 02 627 6450