

Virtsateiden toiminnallinen eli urodynaaminen tutkimus

Tutkimuksessa selvitetään virtsateiden toimintaa mittaamalla virtsarakon, virtsaputken, peräsuolen ja sulkijalihasten painetta ohuiden tutkimuskatetrien avulla. Tutkimus suoritetaan rauhallisessa huoneessa ja on yleensä kivuton, vaikka tutkimuskatetriin liikuttelu voi tuntua epämiellyttävältä. Varaa tutkimukseen aikaa 1 – 2 tuntia.

Sinulla tulisi olla normaali virtsahätä tutkimukseen tullessa, sillä tutkimus alkaa virtsasuihkun virtausmittauksella. Jos normaali virtsaus ei onnistu ja käytössäsi on esimerkiksi toistokatetrointi, voit suorittaa katetroinnit normaaliin tapaan.

Ennen tutkimusta

- Käy virtsanäytteellä kaksi viikkoa ennen
- Tuo tullessasi oheinen virtsaamispäiväkirja täytettynä.
- Mikäli sinulla on ummetusta eikä suoli ole toiminut pariin päivään ennen tutkimusta, ota edellisenä aamuna pienoisperäruike (esimerkiksi Microlax tai Toilax). Voi ostaa ruiskeen apteekista.
- Peseydy huolellisesti (erityisesti alapesu) tutkimuspäivän aamuna.

Tutkimuksen jälkeen

Parin päivän ajan tutkimuksen jälkeen voi esiintyä tihentynyttä virtsaamisen tarvetta, kirvelyä ja vähän verta virtsassa. Tämän vuoksi sinun tulee juoda normaalia enemmän. Mikäli oireet jatkuvat pidempään tai sinulle nousee korkea kuume, hakeudu omaan terveyskeskukseen tai yhteispäivystykseen.

Yhteystiedot

Kirurgian poliklinikka
Tiistai- perjantai kello 8.00 – 14.00
Puhelin 044 707 3807