

Akuuttitilanteeseen liittyvän hyperglykemian korjaaminen vuodeosastolla

Tämä ohje koskee potilaita, joilla ei ole aiempaa insuliinihoitoa tai joilla on käytössä ainoastaan pitkävaikutteinen insuliini.

Glukoositavoite vuodeosastolla on 6-10 mmol/l.

Akuuttitilanteeseen liittyvää hyperglykemiaa korjataan alkuvaiheessa pikainsuliinilla (Apidra[®], Fiasp[®], Insulin Lispro Sanofi[®], Liprolog[®] tai Novorapid[®]) seuraavan ohjeen mukaan:

Glukoosi mmol/l	Korjausinsuliini	Korjausinsuliini
	<ul style="list-style-type: none"> ikä >70 vuotta aliravitsemus munuaisten vajaatoiminta insuliiniherkkä 	<ul style="list-style-type: none"> ikä <70 vuotta insuliiniresistentti BMI >35 kg/m²
10-12	2 yks	4 yks
12-14	3 yks	5 yks
14-15	4 yks	6 yks
16-19	5 yks	8 yks
19-22	6 yks	10 yks
>22	8 yks	12 yks

Jos potilas tarvitsee vuorokauden kuluessa runsaasti korjausinsuliineja (≥10 yksikköä), aloitetaan pitkävaikutteinen perusinsuliini (esimerkiksi Levemir[®] kahteen annokseen jaettuna tai Lantus[®] kerran päivässä) yhteensä 0.2-0.3 yks/kg/vrk. Konsultoi tällöin sisätautilääkärää.

T, A ja U-sairaalan diabeteskonsultaatiot: AA6 sisätautieval (endo) p. 38410