

ANTITROMBOOTTIEN TAUOTUS TOIMENPIDERADIOLOGIALLA

vaikuttava aine	varfariini	enoksapariini daltepariini	tintsapariini	dabigatraani	rivaroksabaani apiksabaani edoksabaani	ASA	klopidogreeli	prasugreeli	tikagrelori
Kauppanimi	Marevan®	Fragmin® Klexane® Ghemaxan®	Innohep®	Pradaxa®	Xarelto® Eliquis® Lixiana®	Aspirin® Primaspan® Disperin®	Plavix® Clopidrogel® Grepid®	Efient®	Brilique®
Tauko	3 vrk	1 vrk	1 vrk	1 vrk	1 vrk	7 vrk	5 vrk	7 vrk	3 vrk
Lab. määrittäminen	INR < 2.0								
	maksa- ja munuaisbiopsioissa INR < 1.5								

Huomioitavaa: Kaikki luontaistuotteet (esim omega-3 valmisteet) tauolle 1 viikko ennen toimenpidettä.

Lääkkeen poistuminen elimistöstä riippuu kliinisestä tilanteesta (voi olla merkittävästi hidastunut esim. akuutti inflammaatio, munuaisten tai maksan vajaatoiminta, pienipainoinen henkilö, vanhus).

Antitromboottisen lääkityksen mahdollinen tauotus on aina potilaskohtaista. Tarvittaessa toimenpidelääkäri antaa arvon vuotoriskistä.