

ANTITROMBOOTTIEN TAUOTUS TOIMENPIDERADIOLOGIALLA

vaikuttava aine	varfariini	enoksapariini daltepariini	tintsapariini	dabigatraani	rivaroksabaani	apiksabaani	edoksabaani	ASA	klopidogreeli prasugreeli tikagrelori
Kauppanimi	Marevan®	Fragmin® Klexane® Ghemaxan®	Innohep®	Pradaxa®	Xarelto®	Eliquis®	Lixiana®	Aspirin® Primaspan® Disperin®	Plavix® Clopidrogel® Efient® Brilique®
Tauko	3 vrk	1 vrk	1 vrk	2 vrk	1 vrk	1 vrk	1 vrk	5 vrk	5 vrk
Lab. määrittäminen	INR alle 1,5								

LISÄKSI KAIKKI LUONTAISTUOTTEET (ESIM OMEGA-3 VALMISTEET) TAUOLLE 1 VIIKKO ENNEN TOIMENPIDETTÄ

Huom! Lääkkeen poistuminen elimistöstä riippuu kliinisestä tilanteesta (voi olla merkittävästi hidastunut esim. akuutti inflammaatio, munuaisten tai maksan vajaatoiminta, pienipainoinen henkilö, vanhus)