

Aorttaläpän laajennus

Tiedustelut: sydänangio puh 32665

Yleistä tutkimuksesta

Aorttaläppä laajennetaan paikallispuudutuksessa pallokatetrilla oikean reisivaltimon kautta. Toimenpide kestää noin 1.5 tuntia.

Toimenpide voidaan tehdä myös päivystysluonteisesti.

Potilasta lääkitään oireiden mukaan.

Valmistelut ennen toimenpidepäivää osastolla

Tarkista

- Molempien nivustaipeiden alueen iho ja ihokarvat poistetaan toimenpidealueelta.

Lääkitys

Katso taulukko: Y:TYKS/Sydänkeskus/Toiminta- ja toimenpideohjeet/Kardiologisiin toimenpiteisiin liittyvät lääketauot ym. 2020

Laboratoriotutkimukset

- Potilaalla tulee olla lähiaikoina (1-2 kk sisällä) tutkittuna PVK, trombosyytit ja S-krea
- INR kontrolloidaan, mikäli potilas on Marevan hoidolla, tai on syytä epäillä muuta hyytymishäiriötä
- EKG tulee olla otettuna ennen toimenpidettä

Valmistelut toimenpidepäivänä osastolla

- Ravinnotta kuusi tuntia ennen toimenpidettä
- Diabeetikoille laitetaan aukioloinfuusio

Keskustele potilaan kanssa toimenpiteestä. Mikäli potilaalla on esimerkiksi selkävaivoja, epätavallisen voimakkaita pelkoja, ilmoita siitä etukäteen angioon.

Jälkihoito osastolla

Punktiokohdassa voi olla jälkivuotoa. Potilas on vuodelevossa angion ohjeen mukaan.

Toimenpiteen jälkeen saa heti juoda ja syödä, mikäli potilaan vointi on hyvä (katso anestesiakaavake).

Lääkitys, kotiutus ja jatkohoito lääkärin ohjeen mukaan.

Mahdollisia komplikaatioita

- Vuodot nivusesta, vakavat komplikaatiot harvinaisia