

Ohje ammattilaisille

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Infektioidentorjuntayksikkö, Tyks

Candida auris –seulonnan näytteenotto

Sytä Candida auris –seulonalle voivat olla esimerkiksi suora sairaalasiirto ulkomaisesta sairaalasta, sairaalahoito tai leikkaus ulkomailla vuoden sisällä, aiemmin todettu altistus Candida aurikselle tai Candida auris – kantajuus.

- Näytteenottokohdat:
 - o nielu
 - o kainalot (yhdellä näytetikulla näyte kummastakin kainalosta)
 - o nivuset (yhdellä näytetikulla näyte kummastakin nivusesta)
 - o rectum (peräsuoli)
- Lisäksi näytteet otetaan mahdollisista infektiofokuksista: haavat, ihorikot, dreenin juuri, trakeakanyylin juuri, katetrivirtsa.
- Näytteet otetaan kahtena eri päivänä. Näytteiden välissä tulee olla vähintään yksi vuorokausi (24 tuntia).
- Jokaiselle näytteenottokohdalle tehdään oma näytteenottopyyntö CaauVi (6633)
- HUOM: samanaikainen sienilääkehoito voi aiheuttaa väärän negatiivisen seulontatuloksen.

Näytteenotto

1. Varaa ottokohtien määrän mukaisesti eSwab-näytteenottoasettejä (Abakus tilausnumero 910050).



2. Ota näyte nielusta, kainaloista, nivusista ja rectumista (peräsuoli). Jokainen näyte otetaan omaan näyteputkeen. Näytteenoton jälkeen katkaise näytetikku

katkaisukohdasta näyteputkeen. Sulje korkki huolellisesti. Liimaa tutkimuspyyntötarra näyteputkeen.

3. Ota näyte tarvittaessa muista infektiofokuksista. Jokainen näyte otetaan omaan näyteputkeen ja sille tehdään oma näytepyyntö CaauVi (6633). Jos potilaalla on virtsakatetri, otetaan siitä virtsanäyte, joka laitetaan eSwabin sijasta 10 ml säilöntäaineettomaan virtsanäyteputkeen.