

DCIS seurantaohje

Tämä ohje on tarkoitettu potilaalle, jolle on tehty rinnan poistoleikkaus varhaisvaiheen rintasyövän tai intraduktaalisen karsinooman

Rinnan poiston (ja rekonstruktion) jälkeen on seurantakäynti kirurgian poliklinikalla kirurgin ohjeen mukaan. Jos rintasyövän hoitoon ei tarvita liitännäislääkehoitoa eikä sädehoitoa, ei käyntiä Syöpäklinikalle tule.

Rintojen kuvantamistutkimukset seurannassa

Kontrollikuvauksia suositellaan niin kauan kuin terveydentila pysyy hyvänä.

Jos rinta on syövän takia kokonaan poistettu, kohdistuu mammografiaseuranta toiseen, jäljellä olevaan rintaan.

Alle 50-vuotiaat

Rinnan poistoleikkaus tehty: mammografia 1 v välein 50 vuoden ikään asti, sitten 2 v välein.

Yli 50-vuotiaat

Rinnan poistoleikkaus tehty: mammografia 2 v välein.

Seulontamammografia sopii rintakuvausseurannaksi: 50-69-vuotiaat naiset saavat kutsun maksuttomaan seulontamammografiaan 2 vuoden välein kotikunnan toimesta. Muussa tapauksessa potilas varaa itse ajan terveyskeskuslääkärille saadakseen mammografialähetteen. Radiologi voi tehdä mammografian yhteydessä ultraäänitutkimuksen. Jos molemmat rinnat on poistettu, ei rintakuvausseurantaa tarvita. Rekonstruktiorintaa ei pääsääntöisesti tarvitse seurannassa kuvata. Rintojen magneettikuvausta käytetään yleisesti ennen rintasyöpäleikkausta kasvaimen laajuuden tutkimiseen, mutta seurannassa rintojen magneettikuvaus tehdään ainoastaan perinnöllisen geenivirheen kantajille, ellei rintoja ole poistettu. Muuten kontrollikäyntejä lääkärin vastaanotolla ei tarvita. Laboratoriokokeita ei suositella oireettomalle potilaalle. Jos potilaalle tulee rintaleikkausalueelle tai toiseen rintaan kyhmy, tai ilmenee kipuja tai uusia tai huolestuttavia oireita, on varattava aika omaan terveyskeskukseen.