

Covid-19 varotoimet, epäilty tai varmistettu tapaus (pisaravarotoimet)

Huom! Aerosolia tuottavissa (liman imu hengitysteistä, nebulisaattorihoito, bronkoskopia, intubaatio, resuskitaatio) käytetään lisäksi FFP2 tai 3-hengityksensuojaa sekä suojalaseja tai kokokasvovisiiriä käytössä ohje: [COVID-19 suojaimet aerosolia tuottavissa toimenpiteissä](#)

Vierailija	Ilmoittaudu osastolla ennen potilashuoneeseen menoa. Vierailut minimoidaan. Opastetaan käsihygienian toteuttamisessa ja suojainten käytössä.
Kädet	Desinfektio käsihuuhteella aina.
SUU-NENÄSUOJUS (kirurginen) lyhytkestoiset käynnit huoneessa	 <u>TAI</u> FFP2- tai FFP3 luokan hengityksensuojain (pidempikestoinen käynti tai aerosolia muodostava toimenpide) 
SUOJALASIT tai kasvovisiiri	 Pisaravarotoimien mukaisesti, oireisen potilaan hoidossa.
Suojatakki	Tarvittaessa, tavanomaisten varotoimien mukaan, jos vaara eriteroiskeista.
Suojakäsineet	Tarvittaessa, tavanomaisten varotoimien mukaan, jos vaara eriteroiskeista.
Siivous/ desinfektio	Kloori 500 ppm/ etanolipohjaiset tuotteet, peretikka/vetyperoksidipohjaiset tuotteet. Kertakäyttövälineet / huonekohtaiset.
Potilaan kuljettaminen	Kuljettaja käyttää suojaimia ohjeiden mukaan. Kuljettaja desinfioi kätensä ennen ja jälkeen kuljetuksen. Potilaalla kuljetuksen ajan kirurginen suunenäsuojaus.

Jokaisen hoitotoimenpiteen jälkeen potilashuoneessa poistetaan käsineet, kädet desinfioidaan ja vaihdetaan tarvittaessa puhtaat suojakäsineet.