

Eritetahradesinfektio

Eritetahradesinfektion toteuttaminen on **jokaisen työntekijän vastuulla**. Veri- ja eritetahrat tulee poistaa välittömästi tahrn ilmaantumisen jälkeen. Eritteissä on mikrobeille ravintoa, kosteutta ja suojaa, jolloin mikrobit pystyvät lisääntymään nopeastikin.

Pidä eritetahravälineet ja käyttöliuos valmiina esim. tahrapakissa.


Käyttölaimennospullossa tulee olla merkittynä aineen nimi, laimennosvahvuus ja kelpoisuusaika (esim. viimeinen käyttöpäivämäärä.) Käytettäessä valmiita käyttöliuoksia tulee pulloon merkitä käyttöönottopäivä.

Varmista liuoksen kelpoisuus ennen käyttöön ottoa.

Eritetahrn imeyttäminen

Aktiiviklooriliuos 500 ppm: (Klorilli®)

Peroksygeeni: (mm. Erisan Oxy +® 2% tai Oxivir Excel® 4,5%)



Soveltuu sekä pienten että suurten eritealueiden poistamiseen ja desinfektioon

- Desinfioi kädet.
- Laita kertakäyttökäsine käteen
- Poista käsineellisellä kädellä eritetahrasta suurin osa imeyttämällä erite paperipyyhkeisiin ja laita pyyhe jätteisiin.
- Kaada sen jälkeen käsineettömällä kädellä eritteisen alueen päälle riittävästi desinfektio-liuosta. Anna vaikuttaa hetki ja sen jälkeen pyyhi huolellisesti tahriintunut alue uudelleen puhtaalla kertakäyttöpyyhkeellä.
- Laita suojakäsine ja kertakäyttöpyyhe suoraan jätteisiin.
- Desinfioi kädet.

HUOM. *Clostridium difficile*n kohdalla klooriliuos 1000 ppm tai Oxivir Excel® 10%

Eritetahrn suorapyyhintä

Aktiiviklooriliuos 5000 ppm : (Klorilli®)

Peroksygeeni: (mm. Erisan Oxy +® 5%, Oxivir Excel® 4,5%)

Soveltuu pienten eritemäärien tai roiskeiden poistamiseen ja desinfektioon

- Desinfioi kädet.
- Laita kertakäyttökäsine käteen.
- Kaada käsineettömällä kädellä liuosta suoraan tahrn tai kostuta kertakäyttöpaperi, jolla desinfioit kontaminoituneen pinnan. Pyyhi pinta huolellisesti.
- Laita suojakäsine ja kertakäyttöpaperi suoraan jätteisiin.
- Desinfioi kädet.

HUOM. *Clostridium difficile*n kohdalla Oxivir Excel® 10%