
Eturauhasen ultraäänitutkimus ja koepalojen otto

Ultraäänitutkimuksella ja koepalojen otolla tutkitaan eturauhasta.

Tutkimus

Ultraäänitutkimus tehdään peräaukon kautta ultraäänianturin avulla. Tutkimus kestää noin 15 minuuttia. Ultraäänitutkimuksen yhteydessä voidaan tarvittaessa ottaa eturauhasesta koepalat. Ennen koepalojen ottoa eturauhanen puudutetaan. Näytteenottoon liittyy pieni tulehdusriski, jonka takia sinulle annetaan antibiootti ennen ja jälkeen tutkimuksen.

Mahdolliset oireet koepalojen oton jälkeen

- Koepalojen oton jälkeen virtsa voi olla veristä jonkin aikaa ja sen takia on hyvä juoda nesteitä normaalia runsaammin (1,5 – 2 litraa/vrk) muutaman päivän ajan.
- Ulosteeissa voi olla verta ja siemenneste voi olla vanhan veristä tai rusehtavaa muutaman viikon.
- Kipuun voit tarvittaessa ottaa reseptivapaita kipulääkkeitä, kuten ibuprofeeni tai parasetamoli.

Jatkohoito

Jatkohoito suunnitellaan koepalavastauksen mukaan. Saat tiedon koepalavastauksista ja jatkohoitosuunnitelmasta puhelimitse tai kirjeitse. Tarvittaessa saat kutsun hoitoneuvotteluun.

Mikäli seuraavia oireita ilmaantuu, ota yhteyttä hoitavaan yksikköön tai päivystykseen

- verentulo on runsasta
- virtsaus ei onnistu
- alavatsalla on jatkuvaa kipua
- nousee korkea, äkillinen kuume