

Gynekologisen syövän vartijaimusolmukkeen gammakuvaus

Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksella paikannetaan se imusolmuke, johon imutiet muutosalueelta johtavat. Tätä imusolmuketta kutsutaan vartijaimusolmukkeeksi. Imusolmukkeen sijainti merkitään tussilla iholle, jotta kirurgin on helpompi leikkauksen yhteydessä löytää se.

Vartijaimusolmukkeen löytyminen ei tarkoita sitä, että syöpä olisi levinnyt tai lähettänyt etäpesäkkeitä. Mahdollinen syövän leviäminen tähän imusolmukkeeseen selviää vasta, kun kirurgi ja patologi ovat sen tutkineet.

Tutkimukseen valmistautuminen

- Isotooppitutkimusta varten et tarvitse esivalmisteluja.
- Leikkausta varten saat tarvittavat valmistautumisohjeet osastolta.

Tutkimuksen kulku

Tutkimusaineena saat pienen määrän radioaktiivista isotooppia. Lääkäri pistää ohuella neulalla tutkimusaineen neljään kohtaan muutosalueen viereen naistentautien osastolla. Edeltävästi saat kipulääkkeen. Sinut tuodaan isotooppiosastolle kuvaukseen joko heti tai kahden tunnin kuluttua, pistoskohdasta riippuen.

Lantion alueelta tehdään leikekuvaus, jonka avulla selvitetään vartijaimusolmukkeen tarkka paikka. Tarvittaessa otetaan 1-2 paikalliskuvaa.

Vartijaimusolmukkeen paikka merkitään ihollesi tussilla tutkimuksen aikana. Imusolmukkeita voi kuvauksessa tulla esille useampikin, mutta tämä on normaalia. Yleensä imusolmukkeet kuvautuvat nivustaipeen alueella.

Kuvaus kestää reilut puoli tuntia ja sen aikaa sinun pitää olla liikkumatta selinmakuulla.

Tutkimuksen jälkeen

Kuvauksen tultua valmiiksi saat mukaasi tarvittavat paperit ja pääset takaisin osastolle odottelemaan pääsyä toimenpiteeseen.

Jos leikkauksesi on vasta seuraavana päivänä ja pääset tutkimuksen jälkeen yöksi kotiin, pitää sinun välttää illan ja yön aikana yli puoli tuntia kestäviä lähikontakteja pieniin lapsiin tutkimusaineesta lähtevän säteilyn takia.

Tarkistettu 5.9.2022