

Hidradenitis suppurativa –taudin aiheuttamien ihomuutosten hiilidioksidilaserointi

Hiilidioksidilaserhoito suoritetaan paikallispuudutuksessa ja pääset välittömästi toimenpiteen jälkeen kotiin, ellei ennalta ole toisin sovittu.

Jälkihoito

- Laserhoidon jälkeen hoidetulle ihoalueelle jää haavapinta. Hoidetun alueen syvyydestä ja hoitokohdasta riippuen alue umpeutuu noin 3-4 viikon aikana.
- Alkuvaiheessa haavapinta erittää kudostietä, mahdollisesti myös verta. Tänä aikana aluetta pitää suihkuttaa haalealla vedellä runsaasti vähintään kerran päivässä.
- Suihkutuksen jälkeen haavapinnalle levitetään antibioottivoidetta (Fucidin).
- Haavasidoksina voi käyttää polyuretaanivaahtosidosta, kuten Allewyn Gentle Border, Kliniderm Foam Silicone Border tai Mepilex Border. Lisäksi Sorbact –nauha, mikäli haavaan jää onkaloa.
- Saunaan saa mennä ja meikkiä käyttää haavapinnan umpeuduttua.

Paraneminen

- Haavapinnalle muodostuva uusi iho on ohut ja punoittava, mutta vaalenee viikkojen kuluessa.
- Hoidettu alue täytyy suojata auringolta vaatteilla tai aurinkosuojavoiteella, jonka suojakerroin on 50. Auringolle alttiit alueet on suojattava vähintään kolmen kuukauden ajan hoidon jälkeen.
- Hoidetulle alueelle saattaa ilmaantua lisäpigmentaatiota, mikä yleensä häviää kuukausien kuluessa. Joskus hoidettu alue näkyy ympäristöään vaaleampana alueena ja tämä pigmentin väheneminen saattaa olla pysyvää.
- Syvempiä ihoalueita laseroitaessa saattaa muodostua myös pinnallista arpeumaa.

Huomioitavaa

- Mikäli sinulla on kysyttävää hoidon jälkeen, voit ottaa yhteyttä hoitavaan yksikköön soittamalla puh. 02 313 1614 ma – pe kello 8.30 – 11.00 sekä ma – to kello 13.00 – 15.00 ja pe kello 12.00 – 14.00.
- Bakteritulehduksen oireena on äkillisesti alkava särky, turvotus ja kuumotus. Ota yhteyttä TYKS Ihopoliklinikkaan tai omaan terveystieteeseen, jos haavassa on tulehduksen merkkejä, se vuotaa runsaasti verta tai sinulla on kuumetta 38°C tai enemmän.