

Imetystauot isotooppitutkimuksissa ja -hoidoissa

12 tuntia

- Tc⁹⁹-perteknetaatti
 - Kilpirauhasen gk
 - Mahalaukun ektooppisen limakalvon gk (Meckelin divertikkeli)
 - Keuhkojen ventilaation gk
- Tc⁹⁹-HDP, Osteocis
 - Luuston gk
- Tc⁹⁹-MAG3, Nephromag, DTPA, DMSA
 - Munuaistoiminnan gk
 - Munuaisparenkyymin gk
 - Mahalaukun toiminnan gk
 - GFR
 - Sydämen oikovirtaus ja pumpputoiminnan gk
- Tc⁹⁹-Stamicis, Sestamibi
 - Sydänlihasperfuusion gk
- Tc⁹⁹-Lyomaa, Pulmocis
 - Keuhkojen perfuusion gk
- Tc⁹⁹-Bromo-Biliaron
 - Sappiteiden gk
- In¹¹¹-kloridi
 - Mahalaukun toiminnan gk
- Tc⁹⁹-HM-PAO/Ceretec
 - Aivoperfuusion gk
 - Tulehduspesäkkeen gk (HM-PAO)

24 tuntia

- Tc⁹⁹-Nanocoll/ROTOP-NanoHSA
 - Vartijaimusolmukkeiden gk
 - Imuteiden gk

Kolme vuorokautta (72h)

- I¹²³-injektioneste
 - Lisäkilpirauhasen gk
 - I¹²³-Datscan

Kolme viikkoa vähintään

- I¹²³-MIBG
 - Kromaffiinikudoksen gk
- SeHCAT⁷⁵
 - Sappihappojen imeytymistutkimus
- I¹³¹-jodidi
 - Radiojodihoito alle 400MBq
 - Kilpirauhasmetastaasien gk

Kuusi viikkoa vähintään

- I¹³¹-jodidi
 - Radiojodihoito 400-800MBq

Lopetettava kokonaan

- P³²-hoito
- I¹³¹-MIBG-hoito
- Sm¹⁵³-hoito

Ohje tarkistettu 15.12.2022.