

Ihokoepalan otto kliinisen neurofysiologian osastolla

Toimenpiteen tarkoitus

Ihokoepalasta (ihobiopsia) tutkitaan ihon tuntohermosäikeiden määrää ääreishermoston sairauksissa kuten polyneuropatioissa. Myös erilaisten kiputilojen selvityksessä voidaan käyttää ihobiopsiaa tuntohermosäikeiden määrän selvittämiseksi.

Valmistautuminen toimenpiteeseen

- Jos käytössäsi on verenhennuslääke (mm. Marevan, Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Lixiana) kerro siitä tutkimuksen alussa. Kerro myös jos sinulla on todettu lisääntynyt verenvuotoriski. **Mikäli käytössäsi on Marevan lääkitys, tarkasta viimeisin INR-arvo, jotta se on tiedossasi tutkimuksen yhteydessä.**
- Ennen toimenpidettä voit ottaa lääkkeitä ja syödä normaalisti.
- Ilmoita mahdollinen tiedossa oleva lääkeaine- tai puudutusaineallergia jo ennen toimenpiteen alkamista!

Toimenpiteen kulku

Koepala otetaan yleensä säären ulkosivulta, n. 10cm nilkasta ylöspäin. Tarvittaessa ihokoepala otetaan muulta alueelta, esim. kivun tutkimuksessa kipualueelta. Toimenpiteen ajan olet sängyllä selinmakuulla.

Lääkäri puuduttaa koepalakohdan ja ottaa ihosta ohuen, halkaisijaltaan noin 3mm kokoisen koepalan. Haavan päälle asetetaan suojalaastari. Aikaa toimenpiteeseen kuluu puudutuksineen noin 15–30 minuuttia. Itse koepalan otto vie aikaa vain noin 1 min.

Toimenpiteen jälkeen

Pidä haava kuivana kahden vuorokauden ajan toimenpiteen jälkeen. Haavan hoidosta annetaan erillinen kirjallinen ohje toimenpiteen yhteydessä.

Patologian yksikön lääkäri antaa ihonäytteestä lausunnon. Lausunto ohjataan tutkimuksen pyytäneelle osastolle tai poliklinikalle, joka kertoo tutkimustuloksista sekä mahdollisista jatkotoimista.