


Keskuslaskimokanyylin pistokohdan puhdistus ja desinfektio




Välineet: Käsihuuhde, desinfektioaine (esim 70% alkoholi tai 2% klooriheksidiini-alkoholi), esiliina, suu-
nenäsuojus, tehdaspuhtaat suojäkäsineet, steriilit
suojäkäsineet, pesupakkaus, steriilejä taitoksia,
steriilejä pumpulitikkuja, NaCl 0,9% 20 ml lagenula,
steriili haavasidos.




Tee tavanomainen käsidesinfektio (20 - 30 sekunnin
hieronta, kunnes kädet ovat kuivat).



Laita tehdaspuhtaat suojäkäsineet desinfioituihin
käsiin. Poista kanyylin suojakalvo tukemalla kanyylin
kiinnitystä. Kanyylin pistokohtaan ja
kantakappaleeseen voi kosketella vain steriilein
välinein. Riisu tehdaspuhtaat suojäkäsineet ja desinfioi
kädet (20-30 sekuntia).



Laita steriilit suojäkäsineet desinfioituihin käsiin. Pese
tarvittaessa veri ja pistokohdan eritteet keittosuolalla,
käytä tarvittaessa pumpulitikkua. Tee ihon desinfektio
desinfektioaineella (esim. Dermades®). Tee desinfektio
pistokohdasta poispäin, huomioi aineen valumissuunta.



Anna desinfektioaineen kuivua iholla. Poista steriilit suojakäsineet.

Desinfioi kädet.

Laita uusi kanyylisidos aseptisesti.



Arvioi kanyylin tarve jokaisessa työvuorossa. Arvioi myös kanyylin ympäröivän ihon kunto, pistoskohdat, punoitus, turvotus, aristus, erityis, ompeleet, kanyylin mahdollinen liikkuminen jokaisessa työvuorossa.

Kirjaa havainnoista ja verisuonikanyylin toimivuudesta hoitokertomukseen jokaisessa työvuorossa.