

---

## Keskuslaskimokanyylin poisto

1. Kanyylin tarve arvioidaan jokaisessa työvuorossa. Tarpeeton kanyyli poistetaan välittömästi.
2. Kanyyli poistetaan, jos se on tarpeeton, toimimaton, tukkeutunut, rikkoutunut, infektoitunut tai epäillään kanyyliperäistä yleisinfektiota.
3. Kanyylin poistossa on huomioitava potilaan hyytymisstatus tai mahdolliset hyytymisjärjestelmään vaikuttavat lääkkeet.
4. Kanyylin poistaa lääkäri tai iv-luvan omaava ja perehdytetty sairaanhoitaja.
5. Kätet desinfioidaan ennen tavaroiden keräämistä ja potilaan valmistelua (käsien desinfektio jokaisen potilaskosketuksen ja potilaan ympäristön koskettelun jälkeen).
6. Kanyylin poistoa varten potilas asetetaan trendelenburgin asentoon (ei tarvita, jos kanyyli asetettu vena femoralikseen tai käsivarren perifeeristen suonten kautta).
7. Kanyyli poistetaan tehdaspuhtain käsinein aseptisesti toimien. Pistokohtaa ei kosketella muuta kuin steriilein välinein.
8. Kanyylin juuresta poistetaan tarvittaessa ompeleet, jonka jälkeen kanyyli vedetään tasaisesti ulos potilaan uloshengityksen tai hengityksen pidättämisen aikana. Tarkistetaan, että kanyyli on saatu kokonaisuudessaan ulos.
9. Pistokohtaa painetaan muutama minuutti steriilillä taitoksella, kunnes vuoto lakkaa. Sen jälkeen pistokohtaan asetetaan steriili, ilmatiivis sidos. Tarvittaessa pistokohdan päälle voidaan asettaa hiekkapussi muutamaksi tunniksi.
10. Pistokohdan saa kastella 24 tunnin kuluttua poistosta.
11. Poiston jälkeen potilas voidaan asettaa kohoasentoon, mutta hänen tulee olla vuodelevossa vähintään tunnin ajan kanyylin poiston jälkeen (ei tarvita, jos kanyyli on asetettu käsivarren perifeerisen suonen kautta).
12. Hoitotapahtuma kirjataan hoitokertomukseen.

## Keskuslaskimokanyyliin liittyvä infektio tai sen epäily

Kanyyli poistetaan lääkärin harkinnan mukaan. Jos on epäily infektiosta, poistetun kanyylin kärki laitetaan viljelyyn. Sen vuoksi kanyylin pistokohta puhdistetaan steriilein välinein vähintään 70-prosenttisella alkoholilla, jotta kanyylin kärki ei poistaessa kontaminoidu ihon bakteereilla. Poistetun kanyylin kärki leikataan steriileillä saksilla steriiliin kuivaan putkeen sen kärkeä kontaminoimatta. Ilmoituksen infektiosta tekee potilaan hoidosta vastaava hoitaja tai lääkäri hoitoon liittyvien infektioiden seurantajärjestelmään (VSSHP:n sairaaloissa SAI -järjestelmä).