

## Koepalan otto

### Valmistautuminen toimenpiteeseen

Toimenpiteessä otetaan muutoksesta koepala eli PAD-näyte, joka lähetetään laboratorioon tutkittavaksi. Saat tiedon näytevastauksesta kirjeitse tai sinulle soitetaan.

Toimenpide tehdään paikallispuudutuksessa ja toimenpiteestä pääsee kotiin samana päivänä.

Toimenpidealueelle voi tulla tikkejä. Saat ohjeen siitä, että poistetaanko ne Tyksissä vai varaatko itse ajan terveyskeskukseen ompeleiden poistoon.

Ennen toimenpidettä

- Käy suihkussa ja pese hiuksesi aamulla tai edeltävänä iltana.
- Älä laita meikkiä (tulehdusriski) tai hajusteita toimenpidepäivänä.
- Pukeudu puhtaaseen ja väljään vaatekseen, jotta sinun on mukava olla.
- Voit syödä normaalisti ja ottaa tavanomaiset aamulääkkeet sekä silmänpainelääkkeet, mutta nesteenoistolääkkeet kannattaa ottaa vasta toimenpiteen jälkeen.
- Ota päivälääkkeet ja insuliinit mukaan sairaalaan.

Jätä arvoesineet ja suuret rahasummat kotiin.

Huomioi, että **välittömästi toimenpiteen jälkeen ei saa ajaa autoa.**

**Jos sinulla on käytössä vertaohentavia lääkkeitä (esim. Primaspan, Aspirin, Marevan,) saat niiden tauotuksesta erillisen ohjeen. Myöskin Omega 3 -valmiste tulee huomioida ja tarpeen mukaan tauottaa.**

Toimenpiteen jälkeen saatetaan pitää kylmäpakkausta noin puoli tuntia, jos toimenpidealueella on verenvuotoa. Tämän jälkeen pääsee lähtemään kotiin.

Mikäli sinulla on kysyttävää/ ilmoitettavaa leikkaukseen liittyvissä asioissa, ota yhteyttä

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri • [www.vsshp.fi](http://www.vsshp.fi) • Vaihde 02 313 0000

Tämä ohje on tarkoitettu hoitosuhteessa oleville potilaillemme.