

Lääkehoito-ohje eturauhassyöpöpotilaalle

Hoidosta päätetään lääkärin kanssa. Hoitojen pituus harkitaan yksilöllisesti. Etäispesäkkeisen taudin hoidossa lääkehoito on pitkäaikainen. Paikallisen eturauhassyövän hoitoon annetaan yleensä myös sädehoitoa. Sädehoitoon yhdistetty lääkehoito kestää 6 kk – 3 v. Sädehoito alkaa 3 – 4 kk kuluttua lääkehoidon aloittamisen jälkeen.

Miten lääkehoito toteutetaan?

Lääkehoito aloitetaan suun kautta otettavilla tableteilla. Tablettien sisältämä antiandrogeeni estää solutasolla testosteronin vaikutuksen. Tabletteja otetaan reseptin ohjeen mukaisesti yhden kuukauden ajan.

Kun olet ottanut tabletteja kahden viikon ajan, sairaanhoitaja pistää lääkkeen ihon alle. Pistoslääke (LHRH- analogi) estää testosteronin tuotannon. Se annetaan kolmen kuukauden välein.

PÄIVÄ1-----2VKOA-----1KK-----

Miten eturauhassyövän hormonaalinen hoito vaikuttaa?

Mieshormoni eli testosteroni lisää eturauhassyövän kasvua. Eturauhassyövän lääkehoito laskee testosteronin pitoisuuden veressä hyvin matalaksi. Kun testosteronin syövän kasvua lisäävä vaikutus estetään lääkkeellisesti, syöpäsolut tuhoutuvat ja eturauhanen pienentyy. Tavallisimpia haittavaikutuksia ovat:

- kuumat aallot
- hikoilupuuskat
- impotenssi
- pistoskohdan ihon punoitus

Haittavaikutukset tuntuvat yleensä voimakkaimmin hoidon alkuvaiheessa. Hoitoosi liittyvistä asioista ja hoidon haittavaikutuksista kannattaa keskustella hoitohenkilökunnan kanssa.

Seksuaalisuus

Lääkehoito tai sädehoito ei ole este seksuaaliselle kanssakäymiselle. Sairastuminen ja hoidot aiheuttavat seksuaalista kyvyttömyyttä ja haluttomuutta. Minäkuva ja seksuaalinen identiteetti

voivat joutua kokonaan uudelleen tarkasteltaviksi. Avoimesti keskustelemalla ongelmista kumppanin, hoitajien, lääkärin ja seksuaalineuvojan kanssa nämäkin asiat usein selviävät.

Muuta huomioitavaa

Lääkkeet ostetaan apteekista. Korvaus on omavastuuosuuden ylittävän hinta. Korvausoikeus anotaan SVB- todistuksella Kelasta.