

LAPSEN RUOKATORVEN, VATSAN, OHUTSUOLEN KONTRASTIAINETUTKIMUS

JC2AB Ruokatorven kontrastiainetutkimus

JD1AB Mahalaukun ja duodenumin kontrastiainetutkimus

JF1AB Ohutsuolen kontrastiainetutkimus

Tutkimuspaikka ja tiedustelut

TYKS /AD2-röntgen tai Majakkaröntgen ML5

Tiedustelut Majakkaröntgen ML5 puhelin 02-3131946

Lähete ja ajanvaraus

Tutkimuslähete ajanvarausohjelmaan

Ajanvaraus Majakkaröntgenistä ML5 puhelin 02 3131946

Tutkimuksen indikaatiot ja kontraindikaatiot

Tutkimuksella selvitetään ruokatorven, mahalaukun ja ohutsuolen toimintaa

Kontraindikaatio: jodivarjoaine allergia

Valmistelu tutkimukseen

Esivalmistelut hoito-ohjeet.fi-sivulta

Tutkimuksen suoritus

Tutkimuksessa lapsi juo makeaa jodipitoista varjoainetta, jonka voi sekoittaa esim. veteen tai mehuun. Varjoaineen juomisen helpottamiseksi voi ottaa mukaan lapsen oman tuttipullon tai mukin.

Ruokatorven kontrastiainetutkimus: radiologi ottaa kuvia lapsen juodessa ja seuraa varjoaineen etenemistä läpivalaisun avulla tai röntgentutkimuksen avulla.

Vatsan ja ohutsuolen kontrastiainetutkimus: radiologi seuraa varjoaineen etenemistä ruoansulatuskanavassa läpivalaisun tai röntgentutkimuksen avulla. Varjoaineen voi tarvittaessa laittaa myös nenämahaletkuun tai gastrostoomaan.

Lapsen tukihenkilö, joka ei ole raskaana, saa olla mukana tutkimuksessa.

Tutkimus kestää noin 30-60 minuuttia, ohutsuolen varjoainekuvaus voi kestää kauemmin.

Tutkimuksen jälkeen saa syödä ja juoda normaalisti. Varjoaine poistuu ulosteen mukana.

Tulostus ja lausunto

Tutkimus arkistoidaan digitaaliseen arkistoon ja se katsottavissa esimerkiksi PACS-kuva-arkistosta ja se on luettavissa radusta.