

Lapsen väliaikaisen keskuslaskimokanyylin hoito

Välineet

- Maski
- Tehdaspuhtaat käsineet
- Steriilit käsineet
- Ihon desinfektioainetta
- Steriilejä taitoksia ja/tai – pumpulipuikkoja
- Steriili suojakalvo puhdistava i.v. -suojasidos

Toimintaohjeet

1. Aseta maski kasvoille
2. Pese ja desinfioi kädet
3. Poista vanhat sidokset tehdaspuhtain käsinein
4. Kostuta steriilit taitokset ja/tai – pumpulipuikot desinfektioaineella (taitokset muovikalvo alaspäin)
5. Desinfioi kädet ja vaihda steriilit käsineet
6. Puhdista punktiokohta, kanyylinletkut ja letkun kiinnityskohdat varovasti
7. Aseta kanyylin päälle suojaksi läpinäkyvä kalvo tai puhdistava i.v. -suojasidos

Vaihda keskuslaskimokanyyliä peittävät sidokset ja puhdista juuri 3-7 päivän välein riippuen sidoksesta. Kanyyli puhdistetaan myös tarvittaessa useammin, jos sidokset ovat kastuneet, likaantuneet tai repsottavat.

Huuhto keskuslaskimokanyyli joka päivä 3 ml hepariinia käyttäen 10ml ruiskua. Vaihda letkut ja kolmitiehanat joka toinen päivä, poikkeuksena kantasolusiirtopotilailla joka päivä.