

Lapsen virtsatiетоimenpiteen jälkeen

Tämä ohje on tarkoitettu tulostettavaksi. Ohje sisältää täytettäviä kohtia.

Lapsellenne on tehty virtsateihin kohdistuva tutkimus, hoitotoimenpide tai leikkaus. Tehty toimenpide voi altistaa virtsatiетulehduksille.

Juominen

Huolehtikaa lapsen riittävästä juomisesta päiväsaikaan. Runsas juominen lisää virtsaneritystä ja ehkäisee virtsatiетulehduksia.

Virtsaaminen

Huolehtikaa, että lapsi käy pissalla 3-4 tunnin välein päiväsaikaan. Virtsarakossa pitkään seisova virtsa altistaa virtsatiетulehduksille.

Estolääkitys

Virtsatiетulehduksia ehkäisevä antibioottihoito eli estolääkitys on usein tarpeen virtsateihin kohdistuvan toimenpiteen jälkeen. Saatte estolääkkeestä sähköisen reseptin ja yksityiskohtaiset annosteluohjeet. Virtsatiетulehdukset ovat mahdollisia estolääkityksestä huolimatta.

Yhteydenotot

Virtsatiетulehdusta epäiltäessä lapsesta otetaan virtsanäyte. Ottakaa yhteyttä hoitavaan yksikköön tai päivystykseen, jos lapsella on virtsatiетulehdukseen viittaavia oireita:

- tihentynyttä virtsaamistarvetta
- kirvelyä virtsatessa
- kuumetta
- virtsa on pahanhajuista

Lääkitys

Jatkohoito
