

Iridotomia laserhoito

Sinulle on varattu aika iridotomiaa varten. Iridotomia tehdään lähes aina siitä syystä, että iiriksen eli värikalvon ja sarveiskalvon välinen ns. kammiokulma, jonka kautta silmänsisäinen neste suodattuu ja kulkeutuu, on rakenteellisesti ahdas. Ahtaus saattaa aiheuttaa silmänpaineen nousua, jos silmänsisäinen neste ei pääse kunnolla kiertämään. Toimenpiteessä tehdään laservalolla iirikselle kaksi tai kolme pientä aukkoa yläosiin, jotta silmänsisäinen neste pääsee kiertämään niiden kautta. Toimenpiteellä ei ole vaikutusta näöntarkkuuteen.

Laserhoito

Tullessasi silmään laitetaan toimenpidettä varten mustuaista supistava tippa. Se voi aiheuttaa päänsärkyä, jota voi hoitaa tavallisilla särkylääkkeillä kuten Panadolilla. Toimenpiteessä laitetaan ensin silmään puudutustippa ja sen jälkeen silmän pintaa vasten asetetaan pieni linssi, jonka kautta laserhoito annetaan. Katse on hyvä pitää liikkumatta koko toimenpiteen ajan. Toimenpiteen aikana laservalo välkkyä ja kuuluu napsahtelua, joka saattaa myös tuntua päässä. Kipua ei tunnu. Toimenpiteen jälkeen pääset kotiin.

Jälkihoito

Toimenpidelääkäri kirjoittaa sinulle silmätippareseptin jälkihoitoa varten. Tippoja laitetaan muutaman kerran päivässä ja käyttö tulisi aloittaa jo samana päivänä. Mahdolliset muut lääkitykset jatkuvat täysin ennallaan, myös silmänpainelääkkeet. Silmä voi toimenpidepäivän ajan tuntua ärtyneeltä. Mitään rajoituksia esim. rasituksen tai pesujen suhteen ei ole. Jälkitarkastus tapahtuu yleisimmin noin kuukauden kuluttua, joko Tyksissä tai sinut hoitoon lähettäneellä silmälääkärillä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri • www.vsshp.fi • Vaihde 02 313 0000

Tämä ohje on tarkoitettu hoitosuhteessa oleville potilaillemme.