

## **Mahalaukun tähystyksessä muutosalueen poisto**

Mahalaukun tähystyksen yhteydessä mahalaukusta on poistettu hyvänlaatuinen kasvainalue EMR- tai ESD -toimenpiteellä. Poiston yhteydessä on aina verenvuodon tai puhkeamisvaaran riski.

### **Toimenpiteen aikana**

- Mahalaukun limakalvon alle ruiskutetaan väriainetta, joka saattaa värjätä virtsan vihreäksi. Oire on vaaraton ja se häviää itsestään.

### **Toimenpiteen jälkeen**

- Vatsa voi tuntua kireältä ja ilmantäytteiseltä mahalaukkuun puhalletun ilman vuoksi. Oireet häviävät vähitellen, kun ilma lähtee pois.
- Poistettu alue lähetetään tarkempiin tutkimuksiin. Näiden tutkimustulosten valmistuminen kestää noin 3 - 4 viikkoa. Saat lääkärille soittoajan tutkimuksen tuloksista ja mahdollisesta seurannan tarpeesta.

### **Mahahapon estolääke (mm. Somac®, Nexium®, Zolt®)**

- Käytä viikon ajan mahahapon estolääkitystä tupla-annoksella.
- Viikon jälkeen jatka normaaliannoksella.

### **Ota yhteyttä hoitavaan yksikköön tai alueesi päivystykseen jos ilmaantuu**

- voimakasta vatsakipua, joka ei helpotu kipulääkkeillä
- verioksentelua
- mustaa ulostetta
- kuumetta yli 38 astetta.