

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAHOITOPIIRI

MAKSATUUMORIT JA TOIMENPIDERADIOLOGIA – HOITOPOLKU

- Termoablaatio (radiofrekvenssi- tai mikroaaltohoito): **JJ7LT** (TT ohj.), **JJ6LT** (UÄ ohj.)
- Angioembolisaatio tai TACE: **PC1BC + PC2ET**, **PG1YT + PG1PT** (TACE)

Ennen toimenpidettä

- Tuore MRI: **JN1BG** (preop kuva, tarvitaan seurantaan)
- Angioembolisaatioissa TTangio: **JN3BC**
- Lab: X-koe, INR, PVK, Krea, maksa-arvot

Välitön seuranta toimenpiteen jälkeen

- Intrahepaattisen tuumoriablaation mahdolliset komplikaatiot ovat
 - Postembolisaatiosyndrooma
 - Intrahepaattinen abskessi
 - Bilooma
 - Maksan vajaatoiminta
- Seurataan kliinistä vointia ja lämpöä
- Lab: maksa-arvot, INR, pvk, CRP, Krea, Na, K, alb

Jatkoseuranta

- 2 kk toimenpiteestä
 - **MRI** Tarkistetaan onko toimenpide ollut riittävä, tmp voidaan tarv. uusua, maksan regeneraatio tässä vaiheessa jo käynnistynyt
 - **Lab**: maksa-arvot, INR, pvk, CRP, Krea, Na, K, alb ja tautikohtainen tuumorimarkkeri
- 4 kk toimenpiteestä – harkinnan mukaan ylimääräinen MRI
- 6 kk toimenpiteestä
 - **MRI**
 - **Lab**: maksa-arvot, INR, pvk, CRP, Krea, Na, K, alb ja tautikohtainen tuumorimarkkeri
 - Jatkoseuranta tautikohtaisesti