
Munuaisvaltimoiden kautta tehtävä sympaattisen hermoston katetriablaatio (Munuaisvaltimoiden denervaatio)

Verenpainetauti on yksi tärkeimmistä valtimotaudin riskitekijöistä. Alle puolet lääkkein hoidetuista verenpainepotilaista on hoitotavoitteessa. Sympaattisella hermostolla ja munuaisilla on tärkeä merkitys verenpaineen säätelyssä. Katkaisemalla sympaattisen hermoston vaikutus munuaisiin saadaan lääkehoidolle reagoimaton verenpaine laskemaan merkittävästi.

Toimenpide suoritetaan paikallispuudutuksessa ranne- tai nivusvaltimon kautta. Toimenpiteen aikana suurin osa potilaista kokee kipua, johon annetaan tehokasta kipulääkitystä. Toimenpide ei ole täysin vaaraton, mutta vakavat komplikaatiot ovat hyvin harvinaisia. Valtimopistosten yhteydessä ranne- ja nivusseudun verenvuodot ovat mahdollisia, mutta yleensä helposti hoidettavissa.

Ennen sairaalaan tuloa

- Ole syömättä vähintään kuusi tuntia ennen sairaalaan tuloa, vettä voit juoda vähän.
- Käyttämäsi lääkityksen ja mahdollisten lääketaukojen suhteen saat erilliset ohjeet, sallitut lääkkeet voit ottaa normaalisti pienen vesimäärän kanssa.
- Ota mukaan käyttössäsi olevat lääkkeet, insuliinit ja luettelo käyttämästäsi lääkkeitä.
- Huomioi jo sairaalaan saapuessasi, että autolla ajaminen on kielletty toimenpidepäivän.

Ennen toimenpidettä

- Hoitaja asettaa sinulle suonikanyylin lääkkeiden antoa varten.
- Saat rentouttavan lääkkeen ennen toimenpidettä.

Toimenpiteen jälkeen

- Toimenpiteen jälkeen olet muutamia tunteja levossa jälkivuotojen välttämiseksi.
- Toimenpiteen kulusta riippuen voit kotiutua joko samana tai seuraavana päivänä.
- Vältä raskaita ruumiillisia ponnistuksia, saunomista ja pitkiä kävelymatkoja viisi päivää toimenpiteen jälkeen.

Ota yhteyttä

- Jos sinulla on kuumetta tai infektiota.
- Jos epäilet tai tiedät olevasi raskaana. Toimenpiteessä käytetään röntgensäteitä.