

Nukutuksessa tehtävä botuliinitoksiini-hoito

Lapsenne on tulossa nukutuksessa eli anestesiassa tehtävään botuliinitoksiini-hoitoon.

Oikea tieto on tärkeää lapselle, jotta hänen turvallisuudentunteensa ja luottamuksensa säilyy. Kerrottehan lapsellenne sairaalaan tulosta ja hänelle tehtävästä toimenpiteestä.

Valmistautuminen tutkimukseen

Kotona ennen sairaalaan tuloa

Lapsen tulee peseytyä edellisenä iltana ennen toimenpidettä. Kiinnittäkää huomiota erityisesti toimenpidealueen puhtauteen.

Lapsen on nukutuksen vuoksi oltava ravinnotta ennen toimenpidettä. Ravinnotta ololla ehkäistään oksentaminen nukutuksen aikana.

- Lapsen on oltava syömättä kello 6.00 lähtien. Äidinmaitoa tai äidinmaidonkorviketta voi antaa vielä neljä tuntia ennen toimenpidettä. Tavallista maitoa ei saa nauttia kello 6.00 jälkeen.
- Vettä tai kirkasta mehua saa juoda pienen määrän (½ - 1 dl) kello 11.00 mennessä.
- Säännöllisessä käytössä olevat lääkkeet lapsi voi ottaa aamulla kotona pienen vesimäärän kanssa.

Toimenpidepäivänä sairaalassa

Osastolle saapuessanne lapselle laitetaan puudutusvoidetta kämmenselkään kanyylin laittoa varten. Toisella vanhemmalla on mahdollisuus seurata lasta toimenpideosastolle ja olla hänen vierellään siihen asti, kunnes hänet nukutetaan. Leikkaussalissa tehtävä toimenpide tehdään noin klo 13 alkaen.

Toimenpiteen jälkeen lapsen vointia seurataan heräämössä ja sen jälkeen osastolla. Kotiutus tapahtuu riittävän seurannan jälkeen ja lapsen voinnin mukaan. Kotimatkan ajaksi lapsella tulee olla saattaja, joka ei voi samanaikaisesti toimia autonkuljettajana – taksilla kuljettaessa yksi saattaja riittää. Nukutuspäivänä lasta ei saa jättää yksin.

Vastaamme mielellämme kysymyksiinne,

Lasten ja nuorten hoidonvaraaja, tavoitettavissa arkisin kello 8-14 puhelin 02 313 2429