

Nukutuksessa (anestesiassa) tehtävä TT-tutkimus

Lapsenne on tulossa nukutuksessa eli anestesiassa tehtävään tietokonetomografiatutkimukseen (TT-tutkimus).

Oikea tieto on tärkeää lapselle, jotta hänen turvallisuudentunteensa ja luottamuksensa säilyy. Kerrottehan lapsellenne sairaalaan tulosta ja hänelle tehtävästä tutkimuksesta.

TT-tutkimus kestää vain muutaman minuutin, mutta lapsen tulee olla liikkumatta tutkimuksen ajan. Tämän vuoksi lapsi tarvittaessa nukutetaan tutkimuksen ajaksi.

Valmistautuminen tutkimukseen

Kotona ennen sairaalaan tuloa

Lapsen on nukutuksen vuoksi oltava ravinnotta ennen tutkimusta. Ravinnotta ololla ehkäistään oksentaminen tutkimuksen aikana

- Lapsen on oltava syömättä vähintään kuusi tuntia ennen tutkimusta. Äidinmaitoa tai äidinmaidonkorviketta voi antaa vielä neljä tuntia ennen tutkimusta.
- Vettä tai kirkasta mehua saa juoda noin desilitran tunti ennen tutkimusta.
- Säännöllisessä käytössä olevat lääkkeet lapsi voi ottaa aamulla kotona veden tai kirkkaan mehun kanssa.
- Hoitaja soittaa tutkimusta edeltävänä päivänä tarkastaakseen lapsen voinnin. Samalla teille ilmoitetaan tarkempi sairaalaan tuloaika.

Tutkimuspäivänä sairaalassa

Osastolla lapsellenne laitetaan puudutusvoide ennen kuin hänelle laitetaan suonensisäisen kanyyli ("unikorkki") nukutusta varten.

Lapsenne viedään tutkimukseen sängyllä. Vanhemmilla on mahdollisuus seurata lasta tutkimusosastolle ja olla hänen vierellään siihen asti kunnes hänet nukutetaan.

Tutkimuksen jälkeen

Heräämisen jälkeen lapsi saa ensin juoda ja sitten syödä vointinsa mukaan.

Lapsi kotiutuu kuvauksen jälkeen voinnin mukaan. Kotimatkan ajaksi lapsella tulee olla saattaja, joka ei voi samanaikaisesti toimia autonkuljettajana – taksilla kuljettaessa yksi saattaja riittää. Tutkimuspäivänä lasta ei saa jättää yksin.

Vastaamme mielellämme kysymyksiinne,

Lasten ja nuorten hoidonvaraaja, tavoitettavissa arkisin kello 8-14

puhelin 02 313 0484