

Nukutuksessa tehtävä tutkimus tai toimenpide

Lapsenne on tulossa nukutusta vaativaan tutkimukseen tai toimenpiteeseen.

Valmistautuminen tutkimukseen

Ravinnotta ololla ehkäistään oksentaminen nukutuksen aikana. **Toimenpidettä ei voi tehdä, jos ravinnotta olo ei toteudu.**

- Toimenpideaamuna **ei saa syödä**. Äidinmaitoa tai äidinmaidonkorviketta voi antaa neljä tuntia ennen sairaalaan tuloa.
- Vettä tai kirkasta mehua saa juoda noin desilitran tunti ennen sairaalaan tuloa.
- Säännöllisessä käytössä olevat lääkkeet lapsi voi ottaa aamulla kotona veden tai kirkkaan mehun kanssa.
- Jos lapsi sairastuu tai tarvitsette lisätietoa tutkimuspäivästä, ota yhteys hoidosta vastaavaan yksikköön.

Tutkimuspäivänä sairaalassa

- Osastolla lapselle laitetaan puudutusvoide kanylointia varten.
- Vanhemmilla on mahdollisuus seurata lasta tutkimus- tai toimenpideosastolle ja olla hänen vierellään siihen asti, kunnes hänet nukutetaan.

Tutkimuksen jälkeen

Heräämisen jälkeen lapsi saa ensin juoda ja sitten syödä vointinsa mukaan.

Lapsi kotiutuu tutkimuksen tai toimenpiteen jälkeen voinnin mukaan. Kotimatkan ajaksi lapsella tulee olla saattaja, joka ei voi samanaikaisesti toimia autonkuljettajana.