
Ohje antikoagulanttihoidosta tahdistintoimenpiteeseen tuleville potilaille, jotka käyttävät suoria antikoagulantteja (Eliquis, Lixiana, Pradaxa, Xarelto)

Ohje koskee potilaita jotka käyttävät uusia suoria antikoagulantteja (Pradaxa, Xarelto, Lixiana ja Eliquis) ja ovat tulossa elektiiviseen tahdistinimplantaatioon tai tahdistingeneraattorin vaihtoon.

Potilaat ohjeistetaan jättämään antikoagulantti ottamatta toimenpidettä edeltävän päivän iltana (toimenpidettä edeltävän päivän aamuannos normaalisti) sekä toimenpidepäivänä. Postoperatiivisesti antikoagulantti-hoito jatkuu toimenpidelääkärin ohjeen mukaisesti.

Ohjeesta voidaan tarvittaessa poiketa hoitavan lääkärin päätöksellä potilaan vuoto- ja tukosriskin mukaan.

Ohje antikoagulantti-hoidosta sepelvaltimotoimenpiteeseen tuleville potilaille, jotka käyttävät suoria antikoagulantteja (Eliquis, Lixiana Pradaxa, Xarelto)

Ohje koskee potilaita jotka käyttävät uusia suoria antikoagulantteja ja ovat tulossa elektiiviseen sepelvaltimotoimenpiteeseen.

Potilaat ohjeistetaan jättämään antikoagulantti ottamatta toimenpidettä edeltävän päivän iltana (toimenpidettä edeltävän päivän aamuannos normaalisti) sekä toimenpidepäivänä. Postoperatiivisesti antikoagulantti-hoito jatkuu toimenpidelääkärin ohjeen mukaisesti.

Toimenpiteen aikana käytetään tavanomaista antikoagulaatiota. Kiireelliset ja päivystykselliset toimenpiteet tehdään joko lyhyemmällä lääketauolla tai ilman taukoa.

Ohjeesta voidaan tarvittaessa poiketa hoitavan lääkärin päätöksellä potilaan vuoto- ja tukosriskin mukaan.

Turussa 7.9.2018

Juha Lund	Antti Ylitalo	Juhani Airaksinen
Vastuualuejohtaja	Vastuualuejohtaja	Toimialuejohtaja