

## **PAKLITAKSELI-solunsalpaajahoito**

Paklitakseli on useiden eri syöpätautien hoitoon käytettävä solunsalpaajalääke, joka annetaan tiputuksena suoneen yhden, kahden tai kolmen viikon välein. Lääkkeen annoksesta riippuen hoitosi kestää kahdesta neljään tuntia. Kahden ensimmäisen hoidon aikana sinua tarkkaillaan tiiviimmin mahdollisen allergisen lääkeainereaktion vuoksi. Tästä syystä varataan sänkypaikka ensimmäiselle ja toiselle hoidolle. Jatkossa voit valita istumapaikan. Veriarvot tarkistetaan aina ennen jokaista hoitokertaa. Niiden avulla valvotaan hoidon vaikutusta ja turvallisuutta.

### **Mitä tulee huomioida Paklitakseli-solunsalpaajahoidossa**

Ennen Paklitakseli-hoidon aloittamista saat allergista reaktiota ehkäisevää lääkettä. Saat erilliset ohjeet esilääkkeistä hoitajalta. Paklitakselin annostelu määritetään jokaiselle potilaalle henkilökohtaisesti. Annostelu tapahtuu tiputuksena eli laskimonsisäisenä infuusiona.

Paklitakseli sisältää alkoholia, moottoriajoneuvojen ajamista tulee täten välttää muutama tunti hoidon jälkeen hoitopäivinä.

Luontaistuotteiden käyttöä ei suositella hoitojen aikana, esim. mäkikuisma. Luontaistuotteista sinun kannattaa keskustella lääkärin kanssa. Myös greippimehun käyttöä on hyvä välttää hoitojen aikana.

### **Paklitakselihoidon mahdollisia haittavaikutuksia**

#### **Kuume**

- Ota yhteyttä hoitopaikkaasi tai hakeudu päivystykseen, jos kuume nousee 38 asteeseen tai sinulla on ollut pientä lämpöä muutamia päiviä.
- Solunsalpaajahoito laskee vastustuskykyä, jolloin tulehdusriski kasvaa. Tämän vuoksi tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta.

#### **Pahoinvointi**

- Voimakas pahoinvointi ei ole tyypillistä Paklitakselihoidon aikana. Jos pahoinvointia kuitenkin tulee, ota pahoinvoinnintorilääkettä annetun ohjeen mukaan.
- Voit estää tai lievittää pahoinvointia syömällä useita pieniä aterioita päivässä tai juomalla runsaasti nesteitä.

#### **Ripuli tai ummetus**

- Hae apteekista ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, esim. ripuliin Imodium® ja ummetukseen esim. Levolac®, Pegorion® tai Laxoberon®.

- Jos oireet jatkuvat useamman päivän lääkityksestä huolimatta, ota yhteyttä hoitopaikkaasi tai hakeudu päivystykseen.

### **Hiustenlähtö**

- On todennäköistä, saat sairaalasta palvelusetelin peruukkia varten.

### **Iho- ja limakalvo-oireet**

- Limakalvot saattavat kuivua. Apteekista voit hakea erilaisia paikallishoitoon käytettäviä tuotteita. Kts. tarkemmat ohjeet solunsalpaajahoito-oppaasta.
- Iho ja kynnet kannattaa suojata hoidon aikana hyvin auringonvalolta.

### **Tuntohäiriöt**

- Tuntohäiriöt ilmenevät lähinnä käsien ja jalkojen pistelynä tai puutumisena. Näistä tulee aina kertoa lääkärille tai hoitajalle!

### **Väsymys ja uupumus**

- Väsymys ja uupumus voivat lisääntyä hoitojen edetessä.