

Peräaukon sulkijalihaksen painemittaus (anomanometria)

Miksi tutkimus tehdään?

Tutkimuksella selvitetään ummetuksen sekä ulosteen pidätyskyvyn heikkenemisen syitä.

Miten valmistaudun tutkimukseen?

Tutkimuksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että peräsuoleessa ei ole ulostetta. Mikäli peräsuolta tunnusteltaessa havaitaan ulostetta, tutkimusaikaa joudutaan siirtämään.

Tutkimusta varten normaali ulostaminen tutkimuspäivänä ei yleensä riitä, vaan tarvitaan lisäksi miniperäruiske (esimerkiksi Microlax). Jos kärsit ummetuksesta ja muuten tarvittaessa, pyydä ohjeet suolen tyhjentämiseen tutkimukseen lähettävältä yksiköltä.

Miten tutkimus tehdään?

Tutkimuksen ajan makaat kyljelläsi. Asetamme peräaukkoosi/peräsuoleesi halkaisijaltaan noin viiden millimetrin paksuisen mittauskatetrin 10-15 cm:n syvyydelle. Katetrilla mittaamme peräaukon sulkijalihaksen paineita. Tutkimuksen aikana joudut supistamaan ja jännittämään peräaukon lihaksia. Tutkimus on täysin kivuton.

Miten kauan tutkimus kestää?

Tutkimus kestää noin 60 minuuttia.

Mistä saan kuulla tutkimustuloksista?

Tutkimustuloksista kuulet sinua hoitavalta osastolta tai poliklinikalta.

Ohje tarkistettu 20.3.2024