

Perikardiumpunktio ja dreneeraus

Sydänpussiin voi eri syistä kerääntyä vaihteleva määrä nestettä. Tämä todetaan sydämen ultraäänitutkimuksella. Neste poistuu usein itsestään. Joskus kuitenkin on tarpeen ottaa sydänpussista näyte nesteen syyn selvittämiseksi (bakteeri-, sieni- tuberkuloosi- ja solunäytteet), tai jos se vaikeuttaa sydämen toimintaa (tamponaatio).

Toimenpide tehdään paikallispuudutuksessa ultraäänen avulla puoli-istuvassa asennossa. Toimenpiteessä sydänpussiin viedään punktioneulan avulla katetri, jonka kautta saadaan tarvittavat näytteet. Sydänpussissa oleva neste valuu itsestään katetrin kautta pussiin. Katetri poistetaan yleensä seuraavana päivänä osastolla. Toimenpide kestää noin tunnin.

Toimenpiteen jälkeen potilaan vointia seurataan sairaalassa.

Toimenpide on suhteellisen turvallinen ja komplikaatiot harvinaisia.

Ennen toimenpidettä ja sen jälkeen sydänlääkäri tekee sydämen ultraäänitutkimuksen ja antaa jatkohoito-ohjeet ennen kotiinlähtöä.

Sydänsairaudet.fi tarjoaa tietoa aikuisten sydänsairauksista, niiden hoidosta sekä ennaltaehkäisystä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri • www.vsshp.fi • Vaihe 02 313 0000

Tämä ohje on tarkoitettu hoitosuhteessa oleville potilaillemme.