

PD-katetrin poisto

Ennen toimenpidettä

- Potilas käy laboratoriossa 1-2 päivää ennen toimenpidettä (APTT, INR, PVK, K, Na ja x-koe).
- Potilas tulee Päiväsairaalaan toimenpideaamuna.
- Tarkista potilaan leikkauskelpoisuus (esim. infektioiden varalta).
- Tarkista lääkelista ja varmista lääketaukojen toteutuminen. Huomioi mahdolliset allergiat.
- Varmista, että potilas on käynyt suihkussa kotona edeltävänä iltana tai aamulla.
- Tarkista ravinnotta olo. Potilaan tulee olla ravinnotta edellisestä illasta klo 22 alkaen.
- Huomioi diabeetikoilla verensokerin seuranta, tarv. Glucose 50mg/ml – infuusio.
- Esilääkitys annetaan lääkärin määräyksen mukaan
- Varmista, että potilaan vatsaontelossa ei ole pd-nestettä ja tee ulosvalutus tarvittaessa.

Toimenpiteen jälkeen

- Potilaan voinnin seuranta; verenpaine, pulssi, verenvuoto.
- Tarkista leikkaushaavan sidokset.
- Kivun seuranta ja hoito.
- Potilaan tulee olla toimenpiteen jälkeen vuodelevossa voinnin mukaan.
- Potilaan tulee nousta sängystä ylös kylkimakuun kautta.
- Potilas saa ruokailla voinnin mukaan toimenpiteen jälkeen.

Kotiutuessa

Potilas kotiutuu lääkärin arvion mukaan (yleensä toimenpidepäivänä).

- Sidokset on pidettävä kuivina 24 h toimenpiteestä.
- Kipulääkitystä voi käyttää tarvittaessa.
- Ongelmatilanteissa potilaan on oltava yhteydessä hoitavaan yksikköön tai tarvittaessa päivystykseen.
- Tarkista leikkaushaavan sidokset.
- Ohjaa potilasta haavanhoidossa ja hakeutumaan ompeleiden poistoon omaan terveyskeskukseen tai hoitavaan yksikköön.